

V. Barovski.

Quelques mots sur le *Cantharis longipennis* Fairm. [Col.].

Cette espèce fut décrite par feu L. Fairmaire¹⁾ à ce qu'il paraît d'après un seul exemplaire dont les antennes étaient brisées. Dans cette espèce le pronotum de la ♀ paraît être constamment plus large que ce lui du ♂; c'est pour cette raison que je suppose que l'auteur a décrit une ♀. En conséquence il me paraît utile d'ajouter quelques mots à la diagnose de *C. longipennis* Fairm.

Latitudo pronoti ♂ quam ♀ distincte minor est; praeterea pronotum ♂ fere quadratum, in ♀ transversum, disco linea media impressa per totam longitudinem (in *C. glasunovi* m.²⁾ solum in dimidio basali), antennae solum subdepressae (scilicet latitudo articulorum maior est quam crassitudo), in *C. glasunovi* m. autem magis dilatatae; articulus 5 articulo 4 longior, antennarum articuli duo primi et tertii basis subtus rufotestacei, ceteri fere piceo-nigri (in *C. glasunovi* m. solum vix infuscati, ferrugineo-rufi).

C. glasunovi m. a *C. longipenni* Fairm. primo aspectu differt longitudine, crassitate coloreque claro antennarum, latitudine pilositaeque clariore elytrorum, quorum basis laevior est.

Long. corporis ♂ 15—17 mm., ♀ 19,5 mm.

3 ♂♂ et 1 ♀ a principe P. S. Trubetskoi 15.VII—8.VIII, 1910 in montibus Kaschmir collecta ante oculos habeo.

1) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, p. XCI.

2) Revue Russe d'Entom., 1909, N 3, 325.