

УДК 595.762.12(575.2)

©1997г. В.А.МИХАЙЛОВ

НОВЫЙ ВИД РОДА *BEMBIDION* (COLEOPTERA, CARABIDAE) ИЗ КИРГИЗИИ

Во время экспедиционных работ в Киргизии в июле 1996 года на северном склоне Заалайского хребта в районе урочища Бардабо автором была собрана серия еще одного неизвестного вида подрода *Pamirium* рода *Bembidion*, что подтверждает предположение о возможных находках новых видов этого подрода в высокогорьях Памиро-Алая и Тянь-Шаня (Михайлов, 1996). Вся серия собрана на высоте порядка 2800 - 3000 м по берегам небольших мареновых озер.


Типы описываемого вида хранятся в коллекции Харьковского энтомологического общества. Вид назван именем известного отечественного биолога и педагога А.Н. Микитюка.

Bembidion (Pamirium) mikitjukovi Michailov, sp. n.

Голотип -♂, Киргизия, Заалайский хребет, Бардабо, 2800 м, 18 - 20.07.1996 (В. Михайлов); паратипы 4♂ и 7♀ собраны вместе с голотипом. Верх черный, металлически-блестящий, со слабым фиолетовым или бронзовым отливом. Голова умеренно массивная, вместе с глазами лишь немного уже переднеспинки; лобные вдавления глубокие и широкие, слабо морщинистые, начинаются за заднеглазничными щетинконосными порами и доходят до основания щетинконосных пор на вершине клипеуса; глаза умеренно большие и выпуклые; виски короткие; лоб слегка выпуклый, блестящий, без следов микроскульптуры, которая хорошо выражена на клипеусе, затылке и висках. Переднеспинка (рис. 1) умеренно выпуклая, слабо морщинистая, примерно в 1,31 - 1,32 раза шире своей длины, на основании примерно такой же ширины как на вершине, её наибольшая ширина впереди середины; боковые края довольно широко окантованы и отогнуты, особенно ближе к основанию, очень слабо закругленные или почти прямые от середины, без выемки или с едва намеченной выемкой перед хорошо выраженным тупыми задними углами; основание почти прямое с двумя четкими основными бороздками; основные вдавления умеренно глубокие, явственно морщинисто точечные, как и все основание переднеспинки; средняя линия глубокая по всей длине; микроскульптура на основании, вершине и отогнутых боковых краях четкая, почти изодиаметрическая, на диске заметно стертая. Надкрылья удлиненные, почти параллельносторонние с наибольшей шириной сразу после середины, примерно в 1,5 - 1,6 шире переднеспинки, в 1,6 - 1,7 раза шире своей длины; плечи умеренно сильно выступающие, окантованы до 5-ой бороздки; последние, включая 7-ю, тонкие и мелкоточечные, перед вершиной слегка стертые; промежутки плоские, вторичные точки на них полностью стертые; микроскульптура повсюду однородная, очень тонкая, у самцов и у самок состоит из поперечной исчерченности.

Эдеагус (рис.2).

По форме и характеру микроскульптуры очень близок к *B. kryzhanovskii* Mich., известному из горного Бадахшана и Туркестанского хребта, но отличается от последнего более густой пунктировкой основания переднеспинки, неглубокими и мелкоточечными бороздками надкрылий, полным отсутствием вторичных мелких точек на плоских промежутках и рядом других признаков. От *B. himalayanum* Andr., близкого по характеру скульптуровки надкрылий отличается строением переднеспинки, более крупными размерами тела и другими морфологическими признаками. Весьма интересна, хотя в целом и вполне закономерна находка здесь и другого вида подрода *Pamirium* - *B. petrimagni* Net., обладающего чрезвычайно широким ареалом, который охватывает высокогорные районы от Каракорума на юге до Памиро-Алая и Тянь-Шаня на севере. Можно предположить, что этот вид является одной из старейших форм подрода, возникшего скорее своего еще в плиоцене, когда происходило сильное тектоническое поднятие гор Центральной Азии до уровня хионасферы. Именно в это время, по всей видимости, создались условия для формирования группы высокогорных аллопатрических видов подрода с современными дизъюнктивными ареалами.



1

2

Рис. 1 - 2. *Bembidion (Pamirium) mikitjukovi* Michailov, sp. n.
1 - переднеспинка, 2 - эдеагус

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Михайлов В.А. Новые и малоизученные виды подрода *Pamirium* рода *Bembidion* (Coleoptera, Carabidae) из Казахстана //Изв. Харьков. энтомол. общ. - 1996. - Т. 4, вып. 1 - 2. - С. 71 - 74.
Andrewes H. E. The fauna of British India, including Ceylon and Burma. Coleoptera, Carabidae. 2. Harpalinae 1. - 1935. - 323 pp.

Харьковский государственный педагогический
университет им. Г.С. Сковороды

V.A. MIKHAYLOV

A NEW SPECIES OF GENUS BEMBIDION (COLEOPTERA, CARABIDAE) FROM KIRGISIA

Kharkov State Teachers University

S U M M A R Y

Description of the *Bembidion mikitjukovi* Michailov, sp.n. of subgenus *Pamirium* from Kirgizia is given.