

Новые для фауны Тывы виды жуков-карапузиков (Coleoptera, Histeridae)

Some new Histeridae (Coleoptera) species for the Tyva fauna

В.К. Зинченко
V.K. Zinchenko

Сибирский зоологический музей, Институт систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе 11, Новосибирск 630091 Россия.
E-mail: mu@eco.nsc.ru.

Siberian Zoological Museum, Institute of Systematics and Ecology of Animals, Russian Academy of Sciences, Frunze str. 11, Novosibirsk 630091 Russia.

Ключевые слова: жуки-карапузики, Coleoptera, Histeridae, Тыва.

Key words: Coleoptera, Histeridae, Tyva.

Резюме. Три вида карапузиков: *Saprinus biguttatus* (Steven, 1806), *Chalcionellus blanchei tauricus* (Marseul, 1862), *Chalcionellus turcicus* (Marseul, 1857) — впервые указаны для Тывы.

Abstract. The three species of Histeridae, *Saprinus biguttatus* (Steven, 1806), *Chalcionellus blanchei tauricus* (Marseul, 1862) and *Chalcionellus turcicus* (Marseul, 1857) have been firstly recorded in the Republic of Tyva.

В материалах Сибирского зоологического музея и сборах, переданных студентом Кызыльского государственного университета В.А. Кызыл-оолом, обнаружены три вида жуков-карапузиков из подсемейства Saprininae, ранее не отмеченных на территории республики Тыва, но известных из сопредельной Монголии. Найденные виды населяют пустынные и степные районы Палеарктики, и обнаружение их на юге Тывы вполне закономерно. Ареалы видов приводятся по О.Н. Крыжановскому и А.Н. Рейхардту [1976].

Saprinus biguttatus (Steven, 1806)

Материал. Тыва, Эрзинский р-н, оз. Тере-Холь, на мясе, 09.07.2004, В.А. Кызыл-оол — 2♀♀.

Распространение. От низовий Волги через Казахстан до Зайсана, Средняя Азия до Ферганы, Северный Иран, Монголия, Китай (Синцзянь, Алашань).

Chalcionellus blanchei tauricus (Marseul, 1862)

Материал. Тыва, Эрзинский р-н, оз. Тере-Холь, 3, 8.07.2004, В.А. Кызыл-оол — 3♂♂.

Распространение. Степная зона Восточной Европы и Азии до Алтая на севере, Афганистан, Монголия и Китай (Внутренняя Монголия).

Chalcionellus turcicus (Marseul, 1857)

Материал. Тыва: Дзун-Хемчикский р-н, пос. Чадан, степь, под навозом, 11.07.1948, Калугин; Эрзинский р-н: оз. Тере-Холь, 3, 9.07.2004, В.А. Кызыл-оол — 2♂♂, 1♀; южный берег оз. Тере-Холь, ур. Шарлаа, пески, 12.06.1995, Д.В. Логунов — 1♀.

Распространение. Степная зона и север пустынной зоны от Волги до Алтая и Монголии, север Синцзяня, Внутренней Монголии, Средняя Азия, Турция, Иран, Афганистан.

Литература

Крыжановский О.Л., Рейхардт А.Н. 1976. Жуки надсем. Histeroidea (семейства Sphaeritidae, Histeridae, Syntellidae) // Фауна СССР. Жесткокрылые. Л.: Наука. Т.5. Вып.4. 436 с.