

— Занимаясь въ послѣдніе годы изученіемъ лепидонтерологической фауны Крыма, пишуцій эти строки совершилъ нынѣшней весной, между прочимъ, и экскурсію на Керченскій полуостровъ, представляющій, для выясненія фаунистическихъ отношеній между Крымомъ и Кавказомъ, несомнѣнный и выдающійся интересъ. Ранне-весеннія экскурсіи вообще мало доступны столычному энтомологу; въ настоящую же поѣздку успѣху экскурсій крайне препятствовала сильно пониженная температура въ Крыму въ апрѣлѣ этого года (напр. въ ночь на 24. IV. 1901 въ крѣпости Керчи — 2° С.). Маршрутъ пишущаго эти строки былъ слѣдующій: Феодосія, дер. Арма-Эли, с. Петровское, экон. Учъ-эли-Кинегезъ, берегъ моря у нея, дер. Сарайминъ, Керчь; съ 19 по 26. IV. 1901. Холодъ и дождь помѣшали сдѣлать основательный сборъ гдѣ бы то ни было, за исключеніемъ ближайшихъ окрестностей Керчи (хребетъ Юзаба, д. Булганакъ). Довольно пышная растительность степи не оправдала ожиданій: кромѣ *Pieris duplidice* Linn., *Colias hyale* Linn. и *edusa* Fabr., *Lithostegia forinata* Hufn. и *griseata* Schiff., *Aspilates ochrearia* Rossi, *Eubolia murinaria* Fabr., наблюдавшихся въ б. или м. значительномъ количествѣ, другіе, немногіе виды взяты лишь единичными экземплярами. Посѣщеніе булганакскихъ сопокъ дало нѣкоторые интересныя виды изъ *Coleoptera* и *Diptera*, очевидно біологически привязанные къ этимъ лужамъ и конусамъ нефтяной грязи. Наиболѣе обыкновенными въ степяхъ изъ *Coleoptera* были *Dorcadiion* sp. sp., *Copridae*, характерныя *Curculionidae*. Матеріалъ ждетъ обработки.—Изъ обзорнія коллекцій мѣстныхъ собирателей удалось получить весьма поучительныя свѣдѣнія по фаунѣ *Lepidoptera*; напр. фактъ нахожденія м.-азиатской и закавказской *Acronycta pontica* Staud., *Lycaena coriolon* Poda var. *caucasica* Led., свойственной только горному Кавказу, и пр. Все это дѣлаетъ керченскую часть Крыма еще болѣе интересной въ лепидонтерологическомъ отношеніи.

Н. И. Кузнецовъ (С.-Петербургъ).

— Обращая вниманіе на помѣщенную выше статью „Къ литоральной фаунѣ Крыма: I. *Phaleria pontica*, sp. n. (Coleoptera, Tenebrionidae)“, А. П. Семеновъ покорнѣйше проситъ всѣхъ, кому представится случай собирать насекомыхъ на песчаныхъ морскихъ побережьяхъ особенно нашихъ южныхъ морей (Чернаго, Азовскаго, Каспійскаго и Аральскаго), искать и собирать представителей рода *Phaleria* (Latr.). Жуки этого рода небольшихъ размѣровъ (дл. отъ 5 до 9 мм.) и рѣзко отличаются отъ всѣхъ представителей сем. *Tenebrioni-*

*dae* особымъ *habitus*'омъ, свѣрѣ напоминающимъ нѣкоторыхъ представителей сем. водолюбовъ (*Hydrophilidae*); и блѣдно-рыжимъ, съ незначительной примѣсью болѣе темныхъ тоновъ, цвѣтомъ при мало-блестящей поверхности кругловато-овальнаго, слегка выпуклаго тѣла. Насѣкомыя эти безкрылы и встрѣчаются въ условіяхъ, указанныхъ въ названной только-что статьѣ. Прислать можно и отдѣльные экземпляры, уложенные на вату съ детальнымъ указаніемъ мѣста, времени и условій ихъ нахожденія, адресуя ихъ Андрею Петровичу Семенову, въ С.-Петербургъ, Вас. Остр., 8 лин., 39.

— Андр. Петр. Семеновъ (Пбг., Вас.-Остр., 8 лин., 39) позволяет себѣ обратить вниманіе всѣхъ собирающихъ насѣкомыхъ на Кавказѣ на малую изслѣдованность фауны водяныхъ жуковъ (*Dyticidae*, *Halipilidae*, *Gyrinidae* и *Hydrophilidae*; также и *Parnidae*) кавказской фауны. Особенно желателенъ матеріалъ по означеннымъ семействамъ изъ верхняго теченія горныхъ рѣчекъ и ручьевъ, съ окраинъ ледниковъ и тающего снѣга и изъ альпійскихъ озеръ. Водяники въ альпійской зонѣ держатся обыкновенно подъ камнями, лежащими на днѣ мелкихъ и быстро текущихъ горныхъ рѣчекъ, нерѣдко у самого берега, почему ловить ихъ можно даже безъ особыхъ приспособленій. Въ Закавказьи долженъ встрѣчаться въ такихъ условіяхъ между прочимъ загадочный *Orectochilus involvens* Fald.,—крупный представитель сем. *Gyrinidae*, густо покрытый пепельно-сѣрыми прилегающими волосками. *Orectochilus*'ы въ горныхъ рѣчкахъ держатся днемъ подъ камнями, лежащими въ руслѣ у самого берега и на мелкихъ мѣстахъ, и только ночью плаваютъ на поверхности воды, подобно нашимъ обыкновеннымъ *вертячкамъ* (*Gyrinus*). Пишущій эти строки будетъ глубоко благодаренъ за доставленіе всякаго матеріала по названнымъ семействамъ съ Кавказа и изъ Закавказья.

— Въ половинѣ мая отправился на Кавказъ членъ-корреспондентъ Русскаго Энтомологич. Общества Ю. И. Бекманъ, задавшійся специальной цѣлью изучить, въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ, энтомологическую (преимущественно колеоптерологическую) фауну восточной части сѣвернаго Кавказа. Г. Бекманъ предполагаетъ пробыть нѣкоторое время въ г. Петровскѣ, откуда будетъ предпринимать экскурсіи какъ по побережью Каспійскаго моря, такъ и въ степи на СЗ. отъ Петровска; позже онъ предполагаетъ посвятить нѣкоторое время экскурсіямъ въ окрестностяхъ Дербента, а затѣмъ думать поселиться въ г. Темиръ-Ханъ-Шурѣ, откуда будетъ совершать экскурсіи какъ въ степь, такъ и въ горы.

— Энтомологическая коллекція покойнаго В. А. Ярошевскаго приобрѣтена Зоологическимъ Музеемъ Императорской Академіи Наукъ.

— Андр. Петр. Семеновъ (Пбг., В. О., 8 лин., 39) обращаетъ вниманіе лицъ, собирающихъ насѣкомыхъ на Кавказѣ и въ Закавказьѣ, на представителей рода *Elaphrus* F. (Coleoptera, Carabidae), еще очень мало изученныхъ въ кавказской фаунѣ. *Elaphrus*'ы попадаютъ, какъ извѣстно, на сырой почвѣ у самой воды (по берегамъ ручьевъ, рѣкъ озеръ, прудовъ и др. водоемовъ) и любить бѣгать по грязи илистыхъ наносовъ, прячась подъ пригнутыми къ почвѣ растеніями, щепками и др. случайными прикрытіями. Весьма желателенъ матеріалъ по р. *Elaphrus* изъ долинъ Главнаго Кавказскаго хребта (въ томъ чис-

лѣ съ Терекъ и Арагвы), не говоря уже о другихъ, менѣе изслѣдованныхъ мѣстностяхъ. А. П. Семеновъ будетъ очень благодаренъ всякому, кто доставитъ ему означенный матерьялъ, за немедленное опредѣленіе котораго онъ охотно берется.

— Занимаясь постепенной разработкой представителей р. *Agrilus* Curt. (Coleoptera, Buprestidae), водившихся въ предѣлахъ Россійской Имперіи и Средней Азіи, А. П. Семеновъ (Пбг., В. О., 8 лин., 39) будетъ глубоко признателенъ за доставленіе ему всякаго матерьяла по этому роду.

---