

О нахожденіи въ предѣлахъ центральной Россіи *Phaneroptera falcata* (Scop.) и *Onconotus servillei* (Fisch. W.) (Orthoptera, Locustodea).

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

Brunner v. Wattenwyl¹⁾ такъ опредѣляетъ область распространения *Phaneroptera falcata* (Scop. 1763): „Auf Wiesen und niedrigen Gebüsch in ganz Mitteleuropa zwischen dem 45. und 48. Breitengrade, reicht südlich wenig über die Alpenthäler hinaus: Ligurien (Dubrony), Sarepta an der Wolga (Eversmann, coll. mea). Ausserdem in Sibirien, Transbaicalien, Amur (coll. mea), Turkestan Mus. Genf“. Эверсманн²⁾ приводитъ этотъ видъ среди „Orthoptera Volgo-Uralensia“ какъ очень обыкновенный въ юго-западныхъ предгорьяхъ Урала (Общій Сыртъ?) и прилегающихъ къ нимъ степяхъ.

Въ августѣ (11 и 20, VIII) и сентябрѣ (2, IX) 1899 г. мнѣ удалось встрѣтить *Ph. falcata* (взрослыя насекомыя) на сухомъ лугу по опушкѣ листовеннаго лѣса въ имѣніи Гремячка, Данковскаго уѣзда Рязанской губерніи. Это новое мѣстонахожденіе значительно (именно до 53¹/₂° с. ш.) продвигаетъ къ сѣверу предѣлы распространения названнаго насекомого въ Россіи.

¹⁾ Brunner v. Wattenwyl, Prodr. d. Europ. Orthopt., 1882, p. 292.

²⁾ Eversmann: Bull. Soc. Nat. Mosc. 1859, I, стр. 129.

Onconotus servillei (Fisch. W. 1846), если къ нему относятся данныя Эверсмана³⁾, только на востокъ Россіи (именно въ Оренбургскихъ степяхъ) наблюдался до 53° с. ш., въ западной же Европѣ, по Brunner'у⁴⁾, не достигаетъ и 48° с. ш., встрѣчаясь лишь въ Болгаріи, южной Сербіи и Венгріи до Пештскаго комитата въ сѣверо-западномъ направленіи. Между тѣмъ видъ этотъ нерѣдокъ въ южной части Рязанской губерніи, гдѣ я его довольно часто встрѣчалъ среди лѣта въ Данковскомъ, Равенбургскомъ и Скопинскомъ уѣздахъ, послѣдній разъ въ VII 1899 г.

Фактъ захожденія этихъ южныхъ формъ въ предѣлахъ центральной Россіи такъ далеко къ сѣверу пріобрѣтаетъ особое значеніе, если его сопоставить съ аналогичными, ранѣе мною констатированными⁵⁾ случаями распространенія жесткокрылыхъ, изъ которыхъ я напому здѣсь нахожденіе въ предѣлахъ Данковского или Равенбургскаго уѣздовъ Рязанской губерніи хотя-бы слѣдующихъ видовъ: *Dorcadion striatum* Dalm., *Dilus fugax* Ol., *Timarcha coriaria* Laich. (var. *rugosa* Duft.)⁶⁾, *Bostrychus varius* Ill., *Nemonyx lepturoides* F., *Codocera ferruginea* Eschsch. Изъ *Orthoptera* я могу указать еще на нахожденіе мною въ Данковскомъ уѣздѣ (пока одинъ только разъ: 15. VII. 1892 у с. Мураевни) *Oedaleus nigrofasciatus* (Deg.), который, впрочемъ, былъ уже найденъ однажды далѣе къ сѣверу, именно въ Клинскомъ у. Московской губ.⁷⁾ (залетъ?).

³⁾ Eversmann: l. c., p. 128 (*Onconotus Laxmanni* Pall.).

⁴⁾ Brunner v. Wattenwyl, l. c. p. 312.

⁵⁾ См. мой „Замѣтки о жесткокрылыхъ Европ. Россіи и Кавказа“ (Bull. Soc. Nat. Mosc. 1898, pp. 68—115, и 1899, pp. 101—141).

⁶⁾ Касаясь въ особой замѣткѣ вопроса объ распространеніи въ Россіи видовъ рода *Timarcha* Latr. (Ежегодн. Зоол. Музея Имп. Акад. Наукъ, 1900, Мелк. изв., стр. V), Г. Г. Якобсонъ повидимому упускаетъ изъ виду мое сообщеніе въ Bull. Soc. Nat. Mosc. 1898, № 1, pp. 109—110.

⁷⁾ См. В. Ульяпинъ, Матер. для энтомол. губ. Моск. Уч. Окр., Синх. сѣтчатокр. и примокр. пасѣк. (Изв. Имп. Общ. Любит. Естествозн. Антроп. и Этногр., VI, 2), 1869, стр. 64.