Note supplémentaire sur le genre *Tropidocerus* Chaud. (Coleoptera Carabidae).

Par-

T. Tschitschérine (Olgino).

Depuis la note que j'ai publiée sur les *Tropidocerus* en 1900 ¹) ce genre s'est enrichi d'une cinquième espèce, voisine de *Tr. dispar* m., mais qui me semble bien distincte:

Tropidocerus affinis, sp. n.—Dessus du coprs d'un bronzé moins obscur que chez le Tr. flavicornis Dej (à peu près comme chez le dispar m.); fémurs jaune testacé, tibias et tarses jaune roussâtre; antennes jaune roussâtre, à scape jaune testacé; rigole latérale du pronotum et des élytres vert bleuâtre.—Forme et sculpture exactement les même que chez le dispar m.²) (angles postérieurs du pronotum absolument pareils), seulement il n'y a aucune trace de ponctuation au bord antérieur du pronotum, les élytres sont moins distinctement rétrécis vers la base et la coloration des pattes est natablement différente, beaucoup plus pâle. La taille ne diffère pas. Long. 14 mm.

Suodan, région du Moyen Niger (A. Chevalier! Muséum de Paris)—1 exemplaire (3).

¹⁾ In Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, pp. 534-540.

²) Cf. l. c., 539.