

Къ географическому распространенію *Forficula auricularia* L.  
(Orthoptera, Forficulidae).

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

---

Въ только-что опубликованной въ XXXV-мъ томѣ „Трудовъ Русск. Энтомол. Общества“ статьѣ о русскихъ видахъ родовъ *Anechura* Scudd. и *Forficula* (L.) Scudd. я указывалъ на невыясненность восточной границы распространенія этой уховертки и высказалъ предположеніе объ ея полномъ отсутствіи въ предѣлахъ Туркестана и Закаспійской области (л. с., р. 199). Что касается Туркестана, то пока нѣтъ ничего, что противорѣчило бы такому предположенію; относительно же Закаспійской области я спѣшу сообщить слѣдующее. Недавно, къ сожалѣнію уже послѣ напечатанія названной статьи, мнѣ попался подъ руку незначительный сборъ насѣкомыхъ А. А. Антонова въ Туркмено-Хорасанскихъ горахъ (Копетъ-дагъ) лѣтомъ 1889 г.; въ немъ нашлось между прочимъ нѣсколько экземпляровъ вполнѣ типичной *Forficula auricularia* L., собранныхъ въ мѣстности Чули. Такимъ образомъ горы Копетъ-дагъ на меридіанѣ Асхабада должны считаться пока самымъ восточнымъ пунктомъ распространенія *Forf. auricularia*. Ея присутствие въ Туркмено-Хорасанскихъ горахъ весьма характерно для послѣднихъ; горы эти заключаютъ въ своей фаунѣ довольно значительный процентъ западныхъ формъ, далѣе въ этихъ широтахъ на востокъ не идущихъ и сталкивающихся тутъ съ типичными представителями туранской, отчасти

специально туркестанской горной фауны. Напомнимъ присутствие въ Туркмено-Хорасанскихъ горахъ веретенницы (*Anguis fragilis* L.) или, напр., жуковъ: *Silpha (Thanatophilus) rugosa* L., *Lucanus ibericus* Motsch.<sup>1)</sup>, *Anthaxia bicolor* Fal d.<sup>2)</sup>, представителя рода *Leptura* L. (*Pedostrangalia kassjanowi* Sokolow)<sup>3)</sup> и нѣк. др., встречающихся здѣсь наряду съ *Liocirus cycloclerus* Solsky и *Plocederes scapularis* Fisch. W.

---

<sup>1)</sup> См. слѣдующую замѣтку.

<sup>2)</sup> Ущ. Ай-дере на Сумбарѣ (зап. Конетъ-дагъ) (К. Г. Эйландъ! 10. V. 1890) (колл. П. П. Семенова).

<sup>3)</sup> Sokolow: Ногае Soc. Ent. Ross., XXX, 1897, pp. 461—463. Этотъ видъ происходитъ, вѣроятно, съ Сумбара, такъ какъ тамъ именно собирали большую частью коллекторъ покойнаго Ф. Ф. Моравица г. Понеранцевъ (ср. F. Mogawitz: Ногае Soc. Ent. Ross., XXII, 1888, p. 235, nota).