

Deux nouvelles espèces de *Dorcadion* Dalm. de l'Asie mineure  
(Coleoptera, Cerambycidae).

Par

**B. E. Jakowleff** (Eupatoria).

---

***Dorcadion pelops*, sp. n.**

♂. Corps ovale, raccourci, entièrement revêtu de velouté noir; articles basilaires des antennes, pattes et une étroite bordure aux élytres rouge fauve; élytres avec une côte humérale faiblement accusée et, chacun, avec 4 bandes longitudinales blanches; tête, scape des antennes, pronotum et en partie les élytres garnis de courtes soies mi-dressées.

Tête assez épaisse, très finement et peu densément ponctuée, revêtue de velouté blanchâtre; front orné, devant les antennes, de deux petites bandes noir velouté; vertex avec deux taches triangulaires de même nuance; front et vertex traversés, au milieu, d'une très fine bande linéiforme, n'atteignant pas, de beaucoup, le bord antérieur de la tête, où elle se transforme en fine carène; le long de cette bande la surface de la tête est légèrement et peu largement impressionnée et revêtue de velouté blanchâtre continu; front et vertex garnis, en outre, de courtes soies noires, qui se retrouvent sur le pronotum et sur le côté externe du scape des antennes.

Antennes assez robustes, courtes, n'atteignant pas, d'un quart de longueur, l'extrémité des élytres, revêtues de velouté délicat blanc-grisâtre; le scape plus épais que les autres articles et beaucoup plus long que le 3<sup>e</sup>, mais d'un tiers plus court que le diamètre de la tête entre la base des antennes; les 3 premiers articles fauve obscur; les autres noirs; tous les articles intermédiaires, à partir du 3<sup>e</sup>, fortement rétrécis vers la base et dilatés vers l'extrémité.

Pronotum convexe, beaucoup plus large que long, à épines latérales courtes et pointues, très densément revêtu de velouté blanc jaunâtre; le disque orné de deux larges bandes longitudinales noir velouté; sillon médian étroit et faiblement accusé, blanchâtre; ponctuation beaucoup plus forte et un peu plus dense que sur la tête; les courtes soies sont noires sur le disque et fauve roussâtre sur les côtés; bord antérieur assez profondément découpé au milieu. Ecusson très étroit, glabre à l'extrémité, sans pilosité.

Elytres en ovale large, plus rétrécis en arrière qu'en avant, avec une côte humérale faiblement accusée, sensible seulement vers la base, et avec des bandes blanches légèrement imprimées, au nombre de 4, dont la marginale plus large que les autres et à bords unis, confluyente avec le velouté blanc des épipleures; l'humérale entière, sensiblement plus étroite que la marginale; la 1<sup>re</sup> dorsale se réunit, à la base et devant l'extrémité, à l'humérale; elle présente, au premier tiers, une petite tache noire, tandis que son tiers apical est pris par une tache noir velouté très longue et assez large, atteignant la côte humérale; cette tache ne laisse subsister, de la bande blanche, qu'un étroit liséré interrompu au milieu; la 2<sup>e</sup> bande dorsale, plus rapprochée de la suture, n'est blanche que tout à la base; elle est continuée ensuite, et jusqu'à l'extrémité des élytres, par une bande continue noir velouté, qui est parsemée, sans ordre, de quelques rares petites taches blanches; bande suturale très étroite, entière et laissant libre la suture même, qui est dénudée et luisante. Extrémité des élytres large, arrondie, avec un liséré dénudé fauve roussâtre; soies noires couchées, plus apparentes seulement à l'extrémité même des élytres. Côte humérale unie, sans dentelures.

Pattes robustes, fauve rougeâtre obscur; les tarses, très dilatés, presque noirs; côté externe des tibias antérieurs et le dernier article des tarses roux rougeâtre vif; brosse de poils, au bord externe des tibias intermédiaires, fauve avec le milieu roux; tibias postéri-

eurs très larges vers l'extrémité, munis de deux épines; tarses postérieurs larges, à métatarse d'un tiers plus long que le 4<sup>e</sup> article; 3<sup>e</sup> article à lobes arrondis; tous les lobes sont entièrement revêtus, en dessous, de velouté jaune vif. Face inférieure du corps blanc grisâtre; dernier segment ventral garni, aux angles externes, de longues soies.

Long. 13,5, larg. 6,25 mm.

Asie mineure: Amasia (*testibus* Dr O. Staudinger & A. Bang-Haas).

Par son faciès, et notamment par le dessin très spécial des élytres, cette espèce rappelle la ♀ de *D. preissi* Heyd.; elle s'en rapproche également par les soies qui garnissent la surface du corps; mais la ♀ de *D. preissi* est bien plus grande (long. jusqu'à 19—20 mm.), le velouté des élytres est à fond châtain, les soies sont très longues, visibles à l'œil nu, la bande humérale est extrêmement large, le prothorax très court, etc.; quant au ♂ du *preissi*, il n'a rien de commun avec notre espèce.

#### **Dorcadion semisetosum, sp. n.**

♂. Corps étroit, entièrement revêtu de velouté noir; pattes, antennes, bord marginal des élytres et extrémité de l'abdomen roux fauve; chaque élytre avec deux côtes dorsales et avec quatre bandes blanches entières; tête, scape des antennes et tout le pronotum garnis de soies dressées.

Tête assez petite, rétrécie en avant, revêtue de velouté blanc grisâtre, avec quelques petites bandes longitudinales fauve obscur sur le front, devant les antennes, et sur le vertex; la surface est longitudinalement traversée d'une très fine ligne médiane qui n'atteint pas, de beaucoup, le bord antérieur; toute la partie antérieure de la tête est garnie, ainsi que le vertex, de fortes soies dressées fauve obscur; antennes roux fauve, quelque peu obscurcies et veloutées vers l'extrémité, bien moins longues que le corps, assez robustes, surtout le scape qui est sensiblement plus long que le 3<sup>e</sup> article, mais moins long que le diamètre de la tête entre la base des antennes, et densément garni de soies roussâtres mi-dressées.

Pronotum assez convexe, aussi long que large, un peu plus rétréci en arrière qu'en avant; épines latérales grandes, émoussées à l'extrémité; surface avec trois sillons longitudinaux blancs, étroits

et peu profonds (un médian et deux latéraux), dont les interspaces sont revêtus de velouté fauve, tandis que, sur les côtés, le velouté est blanc grisâtre; il y a, en outre, au dessus de la base même des épines latérales, une étroite petite bande longitudinale fauve; tout le pronotum est densément garni de soies fauve obscur, miodressées; bord antérieur presque aussi large que la base et assez profondément découpé au milieu. Écusson assez petit, étroit, entièrement revêtu de velouté blanc.

Elytres étroits, trois fois aussi longs que le pronotum et à peine plus rétrécis en arrière que vers la base, avec trois côtes sensibles, une humérale et deux dorsales, revêtues du velouté général fauve obscur, et qui disparaissent sur la moitié apicale; chaque élytre est orné de 4 bandes longitudinales blanches, tranchant très vivement sur le fond obscur; la marginale large, à bords unis et confluent avec le velouté blanc des épipleures; l'humérale de même largeur; la dorsale quelque peu moins large, séparée de l'humérale, sur la moitié basale, par une côte, mais se réunissant à celle-ci sur le quart apical; bande suturale plus étroite que les autres; il y a, auprès de l'écusson, une tache transversale blanche; base de la côte humérale lisse, sans dentelures, avec une tache blanchâtre; bande suturale longée d'une série de taches noir opaque, disparaissant devant l'extrémité des élytres.

Pattes robustes, roux fauve, revêtues de velouté délicat blanc grisâtre; brosse de poils, au bord externe des tibias intermédiaires, roux jaunâtre; tibias postérieurs très dilatés vers l'extrémité, munis de deux épines; tarses longs; métatarse postérieur presque du double plus long que le 4<sup>e</sup> article; lobes du 3<sup>e</sup> article arrondis à l'extrémité, plus élargis aux tarses des deux paires de pattes antérieures, dont les 3 premiers lobes sont, en outre, entièrement revêtus, en dessous, d'une vestiture spongieuse, tandis que, aux tarses postérieurs, ces lobes sont longitudinalement sillonnés au milieu.

Dessous du corps entièrement revêtu de velouté blanc grisâtre, à l'exception du ventre, dont le milieu est presque dénudé et couvert, très densément, de pointillé extrêmement fin; segment anal découpé à l'extrémité et densément frangé de longs poils roussâtres; pygidium ne dépassant pas l'extrémité des élytres. Saillie prosternale de moitié moins large que la mésosternale.

Long. 11, larg. élytr. 4 mm.

Konia (*teste* Edm. Reitter).

Cette espèce se réfère au groupe de formes à dessus du corps entièrement revêtu de velouté continu et à élytres munis de côtes manifestes; dans la faune de l'Asie mineure ce groupe n'était représenté jusqu'à présent que par une seule espèce, *D. aurovittatum* Kr., qui diffère de notre nouvelle espèce, à première vue, par sa taille bien plus grande, par l'absence de soies sur la partie antérieure du corps et par une tout autre disposition des bandes blanches sur les élytres.

---