

Description d'un nouveau *Pentodon* Hope (Coleoptera, Scarabaeidae) de la faune de la Russie.

Par

B. E. Jakowleff (Eupatoria).

***Pentodon nikolskii*, sp. n.**

Pentodon nikolskii A. S e m e n o w in litt.

Corps faiblement convexe, à dessus subopaque; tête large; front bituberculé; épistome arrondi en avant, muni de tubercules assez plats, trois fois plus espacés que les tubercules frontaux; mandibules tronquées à l'extrémité, sans dents saillantes; saillie prosternale claviforme; hanches postérieures avec deux séries de points très gros, le long de leur bord supérieur.

Tête opaque, finement et densément ponctuée sur la moitié antérieure, tandis que la moitié postérieure est plus fortement ruguleuse-ponctuée; épistome largement arrondi en avant, entièrement rebordé d'un bourrelet saillant, avec deux dilatations lobiformes au lieu de dents; ces dilatations très espacées, de sorte que l'interspace prend le tiers de la largeur entière du bord antérieur de l'épistome; ligne frontale manifeste, fine, avec deux tubercules assez petits, mais très accusés et trois fois moins espacés que les tubercules de l'épistome. Mandibules épaisses, tronquées à l'extré-

mité et sans dents, mais les sillons qui, d'ordinaire, séparent les dents, sur la face inférieure des mandibules, sont distinctement indiqués.

Pronotum un peu plus étroit que les élytres, presque parallèle à la base, assez fortement rétréci en avant; angles antérieurs obtus, très distants des yeux; surface couverte de points isolés plutôt petits qui, aux angles antérieurs, deviennent plus fins et y sont accompagnés de fines rides transversales; bord antérieur marginé d'un large bourrelet plat longé d'un sillon transversal; bord postérieur uni, sans rebord; écusson assez petit, lisse, avec, à la base, une impression longitudinale superficielle.

Elytres s'élargissant graduellement vers l'extrémité, à strie suturale entière et profonde; bosses humérales et antéapicales nettement accusées; côtes faiblement saillantes mais très marquées; ponctuation assez forte, uniforme; interstice sutural poli, avec de petits points clair-semés.

Saillie prosternale claviforme; ventre luisant, couvert de ponctuation extrêmement fine; pygidium de forme ordinaire, assez densément ponctué à la base; la ponctuation plus clair-semée vers l'extrémité. Tibias antérieurs munis de courtes dents émoussées et d'un grand denticule intermédiaire entre la 2^e et la 3^e dent; tarses antérieurs assez longs, à 3^e article plus long que le 2^e; hanches postérieures avec 2 séries de gros points; tibias postérieurs avec, à l'extrémité, un espace aplati opaque et entouré de 23 à 24 épines.

Long. 22, larg. 13,5 mm.

Environs du lac Ballasch (Dr A. N i k o l s k y ! Coll. S e m e n o w).

Par ses mandibules tronquées à l'extrémité cette espèce rappelle le *P. mandibularis* Reitt., mais chez celui-ci les tubercules frontaux manquent complètement, l'épistome est tronqué en avant, sans saillies spéciales, etc.