

Новый представитель рода *Engistus* Fieb. (Hemiptera-Heteroptera, Lygaeidae) въ русской фаунѣ.

В. Е. Яковлева (Евпаторія).

Engistus marmoratus, n. sp.

Voisin d'*E. salinus* Jak., dont il diffère par le corps plus grand, garni d'une couche pollineuse blanchâtre (qui disparaît presque totalement chez les spécimens desséchés); yeux pétiolés, débordant les angles antérieurs du pronotum, à peine relevés; premier article des antennes à peu près égal au 2^e; tarses postérieurs à 1^{er} article égal aux 2^e et 3^e pris ensemble: dessus, y comprise la membrane, blanchâtre, couvert de petites mouchetures et taches noirâtres.

♂. Long. 4, larg. 1¹/₄ mm.

♀. Long. 4³/₄, larg. 1³/₄ mm.

Crimée: Eupatoria.

Представители этого рода, очень рѣдкіе вообще, держатся исключительно на солончакахъ, у корней разныхъ солянокъ и встрѣчаются только по южнымъ окраинамъ Европы и берегамъ сѣверной Африки; всего до сихъ поръ извѣстно четыре вида, изъ которыхъ два замѣчены въ ю.-з. Европѣ и два въ низовьяхъ Волги: эти же послѣдніе два вида показаны Ошанинымъ и для низменностей Туркестана.

Въ половинѣ іюня прошлаго года мною былъ найденъ въ Евпаторіи пятый видъ, который встрѣчался въ продолженіе лѣта, по окраинамъ обширнаго солончака („Карантиннаго озера“) исключительно подъ стелящимся по землѣ *Statice caspia* Wild., какое растеніе узкимъ кольцомъ окружало солончакъ. Колоніями или группами видъ этотъ не встрѣчается, а держится по одному, или рѣдко по два экземпляра подъ каждымъ отдѣльнымъ растеніемъ; при этомъ надо пересмотрѣть десятокъ-другой отдѣльныхъ кустиковъ, чтобы найти 1—2 экземпляра; поэтому нашъ видъ, такъ-же какъ и остальные, долженъ быть причисленъ къ рѣдкимъ, хотя я и собралъ его, въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ, до 40 экз. Въ предшествовавшіе два года *E. marmoratus* вовсе не встрѣчался, изъ чего можно заключить, что лѣто 1901 г. было особенно благопріятно для его размноженія.

У живыхъ экземпляровъ все туловище густо покрыто бѣловатымъ налетомъ, изъ-подъ котораго выступаютъ черныя пятна и точки; этотъ цвѣтъ до того близокъ къ почвѣ, на которой держится насѣкомое, что его очень трудно замѣтить, тѣмъ болѣе, что оно мало подвижно, никогда не взлетаетъ и даже не бѣгаетъ, а только притаивается въ неровностяхъ почвы. У сухихъ экземпляровъ налетъ обыкновенно исчезаетъ, и сѣроватое туловище пріобрѣтаетъ мѣстами грязно-зеленоватый оттѣнокъ, а нѣкоторыя черныя пятна болѣе или менѣе теряютъ свой интенсивный цвѣтъ.

E. marmoratus близокъ къ южно-русскимъ видамъ; по внѣшнему облику и отчасти по окраскѣ онъ напоминаетъ *E. salinus* Jak., точный рисунокъ котораго данъ въ Bull. Soc. Nat. Mosc. 1874, tab. X, fig 2; главная разница между ними заключается въ относительной длинѣ члениковъ усиковъ и заднихъ тарзъ; именно, новый видъ имѣетъ 2-ой членикъ усиковъ почти одинаковой длины съ 1-мъ, а первый членикъ заднихъ тарзъ одинаковой длины со 2-мъ и 3-мъ члениками взятыми вмѣстѣ; у *E. salinus* второй членикъ усиковъ на $\frac{1}{4}$ короче перваго, а первый членикъ заднихъ тарзъ гораздо короче двухъ послѣднихъ взятыхъ вмѣстѣ и равенъ по длинѣ только одному 3-му членику; кромѣ того, у *E. marmoratus* перепонка обрызгана черно-бурыми пятнышками, число и интенсивность окраски которыхъ у разныхъ экземпляровъ различны; въ переднихъ углахъ щитка по одному бѣлому бугорку (какъ у *E. boops* Duf.), основаніе же щитка по-

срединѣ, между этими бугорками, черного цвѣта; срединный киль щитка замѣтенъ только передъ острой, нѣсколько утолщенной, вершиной его, которая всегда бѣловатая; первые два кольца спинки черныя, остальное брюшко сверху темно-бурое, съ болѣе свѣтлыми (у сухихъ экземпляровъ—грязно-зелеными) окраинами; первое кольцо брюшка снизу такого-же цвѣта, какъ и все брюшко, которое одѣто бѣлыми волосками, такъ-же какъ внутреннія стороны бедеръ и голеней (на послѣднихъ въ видѣ рѣдкихъ щетинокъ).—Самки новаго вида всегда крупнѣе самцовъ и вообще крупнѣе всѣхъ остальныхъ видовъ.

Можно еще прибавить, что вмѣстѣ съ *E. marmoratus*, подъ тѣмъ-же растеніемъ, встрѣчается *Apion artemisiae* Bessk., который описанъ былъ изъ окрестностей Сарепты, а мною былъ въ свое время найденъ на с.-з. берегу Каспійскаго моря у Брянской пристани.
