

Мелкія лепидоптерологическія замѣтки.

Л. Круликовскаго (Уржумъ).

III ¹⁾.

13. *Vanessa urticae* var. (aberr.?) *violescens* Slevogt. Подъ этимъ названіемъ В. Slevogt описалъ въ Horae Societatis Entomologicae Rossicae, XXXIV, 1900, p. 530, „новую“ форму, которую характеризуетъ слѣдующимъ образомъ: „...Randmonde der Oberseite röthlich-violett schillern.... Wenn man erwähnte Falter, ruhig in der Hand betrachtet, bemerkt man nichts Ungewöhnliches. Das Schillern beginnt aber sofort, falls die Exemplare hin und her gewendet werden“. Я просмотрѣлъ болѣе 30 экземпляровъ *V. urticae* изъ разныхъ мѣстностей Россіи, хранящихся въ моей коллекціи, и 100 штукъ, взятыхъ наудачу изъ числа зимующихъ въ разныхъ постройкахъ въ с. Ашланѣ, Уржумскаго уѣзда, и нашелъ, что болѣе половины недѣлимыхъ имѣетъ голубыя прикраевыя пятна съ фіолетовымъ отливомъ, развитымъ въ болѣе или менѣе сильной степени у разныхъ особей. Очевидно, что форма *violescens* установлена по недѣлимымъ съ наиболѣе интенсивнымъ отливомъ, т. е. на основаніи признака индивидуальнаго и измѣнчиваго, и не имѣемъ за собою никакихъ данныхъ для сохраненія въ наукѣ подъ особымъ названіемъ.

¹⁾ См. Русское Энтомологическое Обзорѣніе, I, 1901, стр. 234—238

14. *Vanessa polychloros* L. var. (aberr.?) *pygmaea* Slevogt. Описанное подъ этимъ названіемъ, l. c. p. 532, уклоненіе аналогично съ ab. *ioides* O. и ab. *urticoides* Ev. et F. de W. и, на ряду съ ними, могло бы быть сохраненнымъ въ лепидоптерологіи, но, повидимому, совпадаетъ совершенно съ уже давно описаннымъ ab. *pyromelas* Frr., которое отъ типичной формы существенно отличается только меньшею величиною.

15. *Argynnis adippe* L. var. *formosa* Stgr. in coll. и var. *taurica* Stgr. При обширномъ распространеніи этого вида въ палеарктической области, въ мѣстностяхъ съ самыми разнообразными физико-географическими условіями, естественно, что онъ образуетъ многочисленныя мѣстныя разновидности или расы (ср. O. Staudinger & H. Rebel, Catal. etc., ed. III, pp. 38—39, и F. Rühl & A. Heyne, Die pal. Grossschm., I, pp. 448—450 et 800; въ недавно вышедшей IV тетради Die Schmett. Europas A. Spuler'a, p. 30, находится описаніе еще новой формы—var. *bainvarica*, охарактеризованной слишкомъ кратко и невразумительно: „sehr feurig gefärbt, die Hinterflügel unten prachtvoll kontrastreich gezeichnet“). Въ моей коллекціи есть двѣ формы, съ которыми я хочу познакомить читателей поближе. Первая изъ нихъ, посылаемая подъ названіемъ var. *formosa* фирмою O. Staudinger & A. Bang-Naas, изъ Пріамурскаго края, повидимому, всего болѣе подходитъ къ var. *pallescens* Butl. и можетъ быть даже идентична съ нею, о чемъ мнѣ трудно судить, имѣя въ рукахъ только краткія описанія послѣдней. Сверху ♂♂ (♀♀ я не имѣю) отличаются отъ крупныхъ особей *Arg. adippe* изъ Поволжья значительно менѣе яркимъ фономъ крыльевъ, который скорѣе можно назвать охряно-желтымъ, а не оранжевымъ. Опыленіе корней крыльевъ менѣе темное, буроватое. Снизу передній край и вершина переднихъ крыльевъ зеленовато-желтые; послѣднія украшена буро-зеленоватыми пятнами безъ всякихъ признаковъ серебристой пыли. Заднія крылья довольно блѣдно-желтыя; нѣжная желто-зеленая окраска ихъ корней наиболѣе развита вдоль передняго и задняго краевъ крыла, а въ дискѣ уступаетъ мѣсто желтой окраскѣ фона. Серебристыя пятна намѣчены очень слабо. Пятна вѣшняго ряда (глазки) охряно-бурья и 3 изъ нихъ снабжены крошечными голубовато-серебристыми зрачками. Прикраевыя пятнышки желтыя, обыкновенно со слѣдами серебристаго опыленія, и извнутри окаймлены буро-зеленоватыми полумѣся-

цами. Вторую форму я имѣю съ Балканскаго полуострова (безъ точнаго обозначенія мѣстности, но, вѣроятно, изъ г. Софіи) въ двухъ экземплярахъ ♀♀. Она очень сходна съ var. *taurica* St gr., судя по описаніямъ и по особямъ изъ Малай Азіи, полученнымъ отъ Е. Funke, но отличается очень блѣдными, почти бѣловатыми переднимъ краемъ и вершиною переднихъ крыльевъ снизу, серебристыми зрачками въ круглыхъ черныхъ пятнахъ тѣхъ-же крыльевъ, помѣщенныхъ между жилками III₃/IV₁ и IV₁/IV₂ (чего нѣтъ ни у одной моей особи var. *taurica*), и очень мелкими глазками внѣшняго ряда на исподѣ заднихъ крыльевъ, представленными бурными точками (посрединѣ трехъ изъ нихъ можно еще разсмотрѣть серебристый зрачекъ изъ немногихъ чешуекъ).

16. **Chrysophanus virgaureae** L. aberr. У одного ♂ изъ окрестностей г. Сарапула, Вятской губ., съ очень сильно развитымъ рядомъ прикраевыхъ черныхъ пятенъ на верхней поверхности заднихъ крыльевъ, два изъ нихъ, ближайшія къ заднему углу крыла, снабжены крошечными, блестяще-голубыми зрачками.

17. **Cyaniris argiolus** L. aberr. Одинъ изъ ♂♂, пойманныхъ въ маѣ 1901 года близъ г. Уржума, имѣетъ рядъ явственныхъ темныхъ луночекъ по внѣшнему краю испода крыльевъ и представляетъ такимъ образомъ переходную форму къ японско-корейской var. *levetti* Butl.

18. **Tephroclystia sinuosaria** Ev. aberr. Этотъ видъ сравнительно мало подверженъ варьировкѣ въ окраскѣ и рисункѣ. Наиболѣе своеобразна, изъ имѣющихся у меня экземпляровъ, ♀ (поймана въ г. Уржумѣ 11. VI. 1899), у которой прикраевая волнистая свѣтлая полоска (*striga submarginalis*, die Wellenlinie) оттѣнена извнутри черно-бурою тѣнью на всемъ протяженіи крыла (верхняго), тогда какъ у нормальныхъ особей такое оттѣнение замѣчается только въ верхней части упомянутой полосы.

19. **Grapholitha inquinatana** H b. a b. *maura* nova. *Differt a formâ genuinâ maculâ albâ alarum anticarum deficiente. Patria certe ignota (Austria?)*.

Уклоненіе это отличается отъ типичной формы полнымъ отсутствіемъ бѣлаго пятна у задняго края переднихъ крыльевъ. По одному экземпляру, происходящему, вѣроятно, изъ Австріи (полученъ отъ J. Dorfinger'a въ Вѣнѣ).

20. **Scythris obscurella** Sc. var. *rossicella* nova. *Var. major, palpis basi minime flavo-pulveratis, alis anticis olivacco-aeneis, uni-*

coloribus, non purpureo-nitentibus. Volat in provinciis Wjatka et Casan Rossiae orientalis; haud rara sub finem maji et junio.

Экземпляры *Scythris obscurella* изъ Вятской и Казанской губерній отличаются отъ западно-европейскихъ значительно бѣлшею величиною, очень незначительнымъ развитіемъ желтоватой окраски у основанія щупалецъ и полнымъ отсутствіемъ пурпуроваго отлива на концѣ переднихъ крыльевъ, почему и заслуживаютъ быть выдѣленными въ особую мѣстную разновидность, которую я предлагаю назвать—var. **rossicella**.
