

О новыхъ для русской фауны жесткокрылыхъ.

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

III *).

11. *Cicindela trisignata* Dej. 1825, извѣстная до сихъ поръ только изъ западной Европы, сѣв. Африки и Малой Азіи, гдѣ встрѣчается исключительно по берегамъ Атлантическаго океана (начиная съ Ламанша) и Средиземнаго моря¹⁾, найдена С. А. Мокрецовымъ 4. VI. 1899 на берегу Чернаго моря въ Евпаторіи (Крымъ). Единственный крымскій экземпляръ, опредѣленный Т. С. Чичеринымъ, находится въ коллекціи Симферопольскаго Музея. Видъ этотъ не былъ извѣстенъ въ фаунѣ Россіи; не показанъ онъ и для окрестностей Одессы²⁾.

12. *Notiophilus pusillus* Waterh. 1833 (= *aestuans* Motsch. 1864 = *longipennis* Putz. 1866 = *bigeminus* C. G. Thoms. 1883)³⁾. Видъ этотъ, выясненный окончательно только весьма недавно, былъ указываемъ для Россіи въ свое время Мочуль-

*) См. это „Обозрѣніе“, II, 1902, стр. 37—38.

¹⁾ Ср. Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, 1895, pp. 12—13.

²⁾ Ср. Куликовскій: Записки Новоросс. Общ. Естествоисп., т. XXI. вып. 1, 1897.

³⁾ См. Spaeth: Verh. zool.-botan. Ges. Wien, 1899, p. 514.

скимъ ⁴⁾ (изъ Крыма) и Putzeys'омъ ⁵⁾ (изъ „Арменіи“). Эти указанія вполне подтверждаются ⁶⁾ и оказывается, что *N. pusillus* широко, хотя можетъ быть и спорадически, распространенъ въ Европ. Россіи. Въ коллекціи П. П. Семенова имѣются экземпляры этого вида изъ слѣдующихъ мѣстностей: окр. Боржома (П. И. Мищенко! 1. VII. 1901); Евпаторія, Таврич. губ. (В. Е. Яковлевъ! 1900); окр. Петрозаводска (А. К. Гюнтеръ! 1898); кромѣ того я видѣлъ 1 экз. этого-же вида въ колл. А. И. Яковлева, происходящій изъ имѣн. Елигово, Боровичск. уѣзда Новгор. губ. (М. М. Миклашевскій! VII. 1894). Принимая во вниманіе, что *N. pusillus* довольно широко распространенъ въ зап. Европѣ (въ томъ числѣ въ Швеціи), надо ожидать, что онъ найдется въ Петербургской губ. и въ Финляндіи, откуда пока не показанъ ⁷⁾.

13. *Notiophilus hypocrita* Spaeth 1899. Видъ этой долго смѣшивался то съ *N. palustris* Duft., то съ *N. aquaticus* L., позже былъ неправильно принятъ за *N. laticollis* Chaud, и лишь очень недавно окончательно выясненъ Spaeth'омъ ⁸⁾. Будучи широко распространенъ въ средней и сѣверной Европѣ, онъ, какъ оказывается, встрѣчается и во многихъ пунктахъ Европ. Россіи, насколько до сихъ поръ извѣстно, въ западной ея части. Въ колл. П. П. Семенова имѣются экземпляры этого вида изъ слѣдующихъ мѣстъ: окрестности Вильны (П. П. и А. П. Семеновы! 2. VI. 1880); окр. Петербурга (Ф. Ф. Моравицъ! 22. IV. 1865); Новая Кирка, Выборгск. губ. (А. В. Григорьевъ! 1890); Куоккала, Выборгск. губ. (А. В. Григорьевъ! 1898). Весьма возможно, что *N. hypocrita* окажется распространеннымъ и далѣе въ восточномъ направленіи; пока же онъ является между прочимъ прибавкой къ фаунѣ Петербургской губ. и Финляндіи, гдѣ страннымъ образомъ ускользнулъ отъ вниманія мѣстныхъ энтомологовъ ⁹⁾.—Все это лишній разъ показываетъ, какъ несовер-

⁴⁾ Motschulsky: Bull. Soc. Nat. Mosc. 1864, II, p. 194 [*N. aesthuanus* (sic!)].

⁵⁾ Putzeys: Mém. Acad. Sc. Liége, (2), I, 1866, p. 164.

⁶⁾ Cp. Reitter: Ent. Nachr. 1897, p. 362.

⁷⁾ См. J. Sahlberg, Cat. Col. Faun. Fenn. (Acta Soc. pro Fauna et Fl. Fenn., XIX, 4), 1900.

⁸⁾ См. Spaeth: l. c., p. 517.

⁹⁾ Cp. J. Sahlberg, op. c.

шенны еще наши свѣдѣнія по фаунѣ даже тѣхъ частей Имперіи, которыя мы считаемъ наилучше изученными.

14. *Eucarterus sparsutus* (Rttr. 1898), извѣстный до сихъ поръ только изъ Мардина въ Турецкой Арменіи¹⁰), найденъ К. А. Сатунинымъ въ іюнѣ 1897 г. во множествѣ въ низменной части Кубинскаго уѣзда Бакинской губерніи; 1 экземпляръ того же вида попался г. Сатунину въ долину Аракса у Шахчинарскаго поста (16. VI. 1894). Въ Кубинскомъ уѣздѣ насѣкомыя эти прилетали ночью на свѣтъ огня вмѣстѣ съ гораздо болѣе тамъ рѣдкимъ *Eriocyprus* (*Eriotomus*) *caucasicus* Dej. Болѣе 100 закавказскихъ экземпляровъ *Eucarterus sparsutus* находятся теперь въ коллекціи П. П. Семенова: опредѣлены они Т. С. Чичеринымъ.

15. *Harpalus* (*Macrophonus*) *oblongus* (Schaum 1858) (*langloisi* Reug. 1858), извѣстный до сихъ поръ только изъ Греціи и Малой Азіи до Сиріи включительно¹¹), встрѣчается, какъ оказывается, и въ предѣлахъ Россіи: онъ найденъ, именно, К. А. Сатунинымъ съ одной стороны въ долину Аракса (постъ Маральянъ, VI. 1894; 1 экз.), съ другой—въ низменной части Кубинскаго уѣзда Бакинской губ. (2. VI. 1897; 2 экз.). Опредѣленіе трехъ экземпляровъ, находящихся теперь въ колл. П. П. Семенова, сдѣлано Т. С. Чичеринымъ.

¹⁰) См. Reitter, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XLI (Verh. Naturf. Ver. Brünn, XXXVIII), 1900, p. 54.—Въ колл. П. П. Семенова имѣется 1 экз. этого вида изъ Сиріи, приобретенный у Staudinger & Bang-Haas.

¹¹) См. Reitter, l. c., p. 59.