

Новыя данныя о *Callipogon (Eoxenus) relictus* Sem. (Coleoptera, Cerambycidae).

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

(Съ рис.).

Въ 1898 г. мною былъ описанъ впервые по единственному экземпляру ♀, любезно доставленному В. Е. Яковлевымъ, новый видъ неотропическаго рода *Callipogon* Serv., принадлежащій, какъ это на первый взглядъ ни парадоксально, русской фаунѣ¹⁾. Экземпляръ В. Е. Яковлева происходилъ изъ южной части нашей Приморской области, но былъ лишенъ, къ сожалѣнію, точныхъ данныхъ о мѣстѣ и условіяхъ нахожденія. Несмотря на то, что мною въ цитированной статьѣ было дано подробное истолкованіе этого факта съ зоогеографической точки зрѣнія,—аполлогія такъ сказать его закономѣрности, онъ возбуждалъ, видимо, нѣкоторыя сомнѣнія среди скептиковъ, пытавшихся объяснить нахожденіе вида *Callipogon* на нашемъ крайнемъ Востокѣ завозомъ туда откуда-нибудь этого насѣкомаго²⁾. Я и самъ склонилъ

¹⁾ Андрей Семеновъ, *Callipogon (Eoxenus) relictus*, sp. n., представитель неотропическаго рода дровосѣковъ (Cerambycidae) въ русской фаунѣ (Новае. Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, pp. 562—580).

²⁾ Можетъ быть въ связи съ такимъ толкованіемъ находится попытка ввести въ русскую фауну индо-малайскую *Sternocera sternicornis* L. (ср. замѣтку Г. Якобсона въ Ежегодн. Зоол. Муз. Акад. Наукъ 1900, стр. IV), — попытка

ся бы въ свое время къ подобному предположенію, еслибы можно было допустить, что такое крупное насѣкомое, какъ *Callipogon relictus*, могло ускользнуть отъ вниманія всегда жадныхъ на крупные и красивые виды собирателей насѣкомыхъ въ тропическихъ странахъ и остаться, вслѣдствіе этого, неописаннымъ³⁾; кромѣ того мною достаточно выдвинуто въ первомъ описаніи, что *Callipogon relictus* настолько сильно уклоняется отъ своихъ американскихъ сородичей, что для него можно установить особый подродъ (*Eoxenus*). Вслѣдствіе этого я и не сомнѣвался въ томъ, что *Callipogon relictus*—автохтонъ на нашемъ крайнемъ Востокѣ.


Съ тѣхъ поръ было приложено много стараній, чтобы получить дальнѣйшій матеріалъ по *Callipogon relictus*; благодаря широкому содѣйствію моего отца П. П. Семенова это мнѣ удалось въ полной мѣрѣ. Сперва, благодаря просвѣщенной отзывчивости администраціи Иркутскаго Промышленнаго училища мы получили тотъ экземпляръ (какъ оказалось, ♀), на существованіе котораго мнѣ любезно указалъ въ свое время В. Е. Яковлевъ. Экземпляръ этотъ, на которомъ значилось только, что онъ происходитъ изъ „окрестностей Владивостока“, описанъ мною въ особой „Дополнительной замѣткѣ о *Callipogon (Eoxenus) relictus* Sem.“⁴⁾. Затѣмъ, благодаря любезному участию Д. Л. Иванова въ Иркутскѣ, намъ въ началѣ текущаго 1902 года удалось получить третій, превосходный экземпляръ также самки *Callipogon relictus*, найденный, отчасти по нашимъ указаніямъ, 14. VII. 1901 С. А. Подъяконовымъ, который сообщилъ Д. Л. Иванову первыя точныя данныя о нахожденіи этого замѣчательнаго жесткокрылаго въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Большого жука дровосѣка я поймалъ 14 іюля по дорогѣ въ Анучино, между станціями Ивановской и Тарасовской, въ 9 ч. утра (приблизительно), на ольховомъ кустѣ. Онъ до того великъ, что я замѣтилъ его, сидя

напрасная, такъ какъ едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что насѣкомыя рода *Sternocera sternicornis* завозятся во Владивостокъ лицами, приобретающими ихъ гдѣ-нибудь по пути, напр. въ Индо-Китаѣ.

³⁾ Напомнимъ, что всѣ прочіе (центрально-и южно-американскіе) представители этого рода давно описаны во всѣхъ подробностяхъ. Мысль о завозѣ къ намъ *Callipogon relictus* нельзя было допустить и потому, что въ такомъ случаѣ насѣкомое это оказалось бы навѣрно завезеннымъ и въ другіе порты, внѣ Россіи.

⁴⁾ Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, pp. 300—302.

въ тарантасѣ“. Эта счастливая находка сразу освѣщаетъ истинныя мѣста обитанія нашего вида: Д. Л. Ивановъ любезно сообщилъ намъ, что мѣсто, гдѣ *Callipogon relictus* найденъ г. Подьяковымъ, лежитъ на сѣв. склонѣ водораздѣла рѣкъ Лефу и Даубихэ (басс. Амура и Ханки) съ одной стороны и Май-хэ съ Сучаномъ—съ другой (басс. залива Петра Великаго), т. е. внутри страны, которая составляетъ самую южную часть нашей Приморской области, что вполне подтверждаетъ мои предположенія⁵⁾.



Callipogon (Eoxenus) relictus Sem. ♀.
(Натуральная величина).

Наконецъ совсѣмъ недавно, благодаря указаніямъ П. Ю. Шмидта и просвѣщенному вниманію администраціи Владивостокскаго отдѣленія Пріамурскаго отдѣла Импер. Русскаго Географическаго Общества мы получили еще 3 экземпляра *Callipogon relictus*, въ томъ числѣ 1 экз. неописаннаго еще ♂, съ указаніемъ, что жуки

⁵⁾ Ср. мою первую статью: *Notae Soc. Ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 576.

эти доставлены были въ 1897 г. также изъ урочища Анучино Южно-Уссурийскаго края Примурской области.

Имѣя въ виду дать въ ближайшемъ будущемъ въ „Трудахъ Русск. Энтомологич. Общества“ подробное описаніе самца *Callipogon relictus* и рисунки представителей обоихъ половъ этого замѣчательнаго жука, мы воспроизводимъ здѣсь любезно снятую для насъ Н. Я. Кузнецовымъ фотографію съ прекраснаго экземпляра ♀, найденнаго С. А. Подъяконовымъ и доставленнаго намъ Д. Л. Ивановымъ. Этимъ мы обращаемъ вниманіе всѣхъ русскихъ энтомологовъ на одного изъ замѣчательнѣйшихъ въ зоо-географическомъ отношеніи представителей русской фауны, являющагося въ то-же время самымъ крупнымъ у насъ (по длинѣ) жесткокрылымъ ⁶⁾. Этотъ жукъ, являющійся безспорно живымъ свѣдѣтелемъ отдаленной геологической эпохи съ инымъ, чѣмъ теперь, климатомъ, заслуживаетъ всесторонняго біологическаго изученія, на что мы обращаемъ вниманіе мѣстныхъ изслѣдователей, надѣясь получить отъ нихъ дальнѣйшій матеріалъ для сужденія и о современномъ географическомъ распространеніи этого „живого ископаемаго“ ⁷⁾. Было бы очень прискорбно, еслибы это, теперь вѣроятно уже вымирающее насѣкомое, ради своего роста и красивой внѣшности, сдѣлалось объектомъ спеціальной, истребительной охоты невѣжественныхъ собирателей и предметомъ спекуляцій столь многочисленныхъ заграницей торговцевъ насѣкомыми.

Въ заключеніе этой замѣтки выражаемъ еще разъ глубокую благодарность лицамъ и учрежденіямъ, содѣйствовавшимъ сосредоточенію въ нашихъ рукахъ перечисленнаго только-что матеріала и давшимъ намъ такимъ образомъ возможность выяснить окончательно систематическое положеніе русскаго представителя неотропическаго рода *Callipogon* Serv.

⁶⁾ Нельзя не отмѣтить здѣсь еще разъ того факта, что этотъ гигантъ русской колеоптерологической фауны, достигающій въ длину 9 сантиметровъ (♂) и водившійся въ области, которой Россія владѣетъ уже болѣе 40 лѣтъ, оставался до сихъ поръ никому неизвѣстнымъ. Это лишній разъ указываетъ на низкій уровень нашего даже предварительнаго знакомства съ отечественной фауной.

⁷⁾ Вполнѣ естественно ожидать, что *Callipogon relictus* найдется также въ сѣверной части Кореи и можетъ быть въ смежной съ нами Манчжуріи.