Un nouveau *Coriomeris* (Hemiptera-Heteroptera, Coreidae) des Alpes de la Suisse.

Par

B. E. Jakowleff (Eupatoria).

Il y a quelques années (1895), le Dr. Horváth sépara de *Coriomeris scabricornis*, sous le nom de *C. alpinus*, une espèce distincte qu'on trouve en France et en Suisse¹). Ayant récemment reçu du Dr. Puto un spécimen de *C. alpinus* de Bérisal (Valais) et l'ayant soigneusement comparé à la description de Horváth, je me suis convaincu, que cet exemplaire, quoique voisin de *C. alpinus*, représente néanmoins une autre espèce, bien distincte et nouvelle, pour laquelle je propose le nom de *C. alticola* m.

Les distinctions entre l'*alpinus* Horv. et l'*alticola* m. résident tant dans le manque de certains caractères différentiels que Horváth mentionne pour son espèce, que, par contre, dans l'existence de tels autres caractères, dont il n'est rien dit dans la description de l'*alpinus*, malgré qu'il sautent positivement aux yeux.

Ainsi, d'après la description du Dr. Horváth, le *C. alpinus* aurait le dessus de la tête uni, sans tubercules; des tubercules antennifères droits (non arqués) et tronqués; des élytres à bords la-

¹) Revue d' Ent. Fr. 1895, p. 155.

téraux garnis de spinules simples, non sétifères; enfin, le dos de l'abdomen en grande partie noir. Chez le spécimen en question de *C. alticola* m. la tête est, au contraire, munie, notamment dans sa partie antérieure, de forts tubercules obtus et brièvement sétifères, les tubercules antennifères sont longs et crochus en dedans, les spinules granuliformes, au bord externe du corium, sont garnies de soies manifestes et dirigées en arrière, comme d'habitude; enfin, le dos de l'abdomen est d'un roux clair. En outre, ce spécimen présente certains caractères très essentiels, qui ne sont pas relevés dans la description de *C. alpinus*; ainsi, les bords latéraux du connexivum sont unis, dépourvus de denticules aigus et saillants à l'extrémité de chaque segment; on n'observe qu'une saillie rectangulaire et cela seulement au pénultième segment; les côtés de la tête, en dessous des yeux, sont densément et finement granuleux avec, parmi la granulation, quelques petits poils courts, très clair-semés et à peine sensibles; cette granulation envahit certaines parties du sternum et de l'abdomen ainsi que les lames rostrales (chez les autres espèces de ce genre on n'observe jamais un pareil développement de granulation dénudée et les côtés de la tête sont toujours plus ou moins densément revêtus de longs poils couchés); enfin la coloration dominante des antennes est noire, le 2^e article en entier et la moitié basilaire du 3^e étant seuls fauve obscur; le 3^e article est, en outre, non pas cylindrique, mais notablement dilaté vers son extrémité.

Quoique le Dr. Horváth n'ait décrit qu'un ♂ de *C. alpinus*, tandis que mon unique spécimen de *C. alticola* m. est une ♀, les caractères différentiels que je viens de relever sont si saillants, qu'ils autorisent parfaitement à séparer l'*alticola* spécifiquement, et cela avec d'autant plus de certitude, que les distinctions sexuelles qu'on observe chez les espèces du genre *Coriomeris* ne sont généralement que peu sensibles.

Coriomeris alticola, sp. n.

♀. Dessus noirâtre, à poils très courts et couchés; tête munie de tubercules pilifères; tubercules antennifères assez minces, crochus en dedans; antennes scabres, brièvement poilues, noirâtres, le 2^e article et la moitié basilaire du 3^e fauve obscur, le 3^e distinctement dilaté vers l'extrémité, le 1^{er} plus long que le 2^e, celui-ci

un peu plus court que le 3^e; côtés de la tête (en dessous des yeux) densément et finement granuleux (la granulation pâle), à pilosité à peine sensible; lames rostrales pareillement granuleuses, obtuses, non prolongées en avant. Côtés du pronotum sensiblement sinués, blanchâtres, avec 12—13 épines alternativement courtes et longues, terminées par un poil plus court que les épines; épine humérale courte, dirigée en dehors. Ecusson plus long que large, concolore, à peine plus clair au sommet. Bords latéraux des élytres blanchâtres à la base, garnis d'une rangée de petites spinules terminées par un poil recourbé. Dos de l'abdomen roussâtre; connexivum uni, sans dents aigues à chaque intersection, le pénultième segment seul présentant une petite saillie rectangulaire.

Long. $8\frac{3}{4}$, larg. $2\frac{1}{2}$ mm.

Suisse, Valais: Bérival (coll. A. P u t o n).