

Thryptocera (*Gymnopareia*) *pomonellae* Schnabl &
Mokrz., sp. nov., ♂♀ (Diptera, Muscidae).

Auctore

S. Mokrzecki, symphoropolitano.

Thryptocera pomonellae, sp. n.

Thryptocera (Mg.), subgeneris *Gymnopareia* Brauer. Nigra, oblongo-ovata. Caput aspectu a latere obovatum superne latius; fronte subprominulâ, in utroque sexu latâ; vitta frontali latâ, fuscâ aut cinereâ, albido-micante; setis orbitalibus 2; s. fronto-orbitalibus 5 ♂, 6—7 ♀, paullo infra antennis descendentibus. Antennae deflexae, multum supra medium capitis insertae, longitudine faciei, validae, latae, articulis basalibus obscure brunneis, partim nigricantibus; articulo ultimo nigro, secundo triplo longiore; aristâ rectâ, nudâ, mediocri, incrassatâ, triarticulatâ, articulo medio primo triplo longiore, ultimo ab mediâ parte subito capillari. Orbitae frontales latae, glauco-cinereae; facies aspectu a latere recedens, glauco-cinerea, vibrissis ordinariis apice decussatis munita; carinae faciales inferne setulosae; genae latae, sat dense setosae; palpi fulvi. Os non prominens.

Thorax niger, immaculatus, leviter cinereo-micans, metathorace nigro nitido; scutello nigro, pollinoso; subscutello grisescenti-albido; setis dorso-centralibus externis sat parvis 3, s. praescutellaribus internis 2; s. sterno-pleuralibus 3 in triangulo rectangulari (ut in *Coenosiis*) dispositis. Squamae lutescenti-albidae, halteres luteo-fuscae.

Abdomen ovatum, in ♀ late ovatum, subdepressum, nitidum, fere glabrum, postice setosum (macrochaetae tantum marginales, in segm. 4^o etiam discoidales), cingulis 3 angustis griseo-albidis in medio interruptis. Hypopygium mediocriter longum, nigrum, nitidum, sub anum inflexum.

Alae latiusculae, hyalinae, levissime fuscatae, basi in ♀ leviter flavidae; costâ subnudâ, spinulâ costae parvâ; venâ mediastinali ad apicem angulatim flexâ; v. *subcostali* (1^a longit.) incrassatâ, nigrâ, *setulosâ*, ad 1/2 costae excurrente; venâ cubitali (3^a) in summo apice alae excurrente; *ad basin venae cubitalis in ♂ setâ unicâ longâ, in ♂ set. 2;* curvaturâ v. discoidalis (4^{ae}) arcuatim angulatâ, angulo subobtusos; v. transversâ apicali („Spitzenquerader“) in medio flexâ et in apice

alae cum v. cubitali nec intime conjunctâ; hinc cellulâ posteriore primâ apice nonnihil apertâ; segmento ultimo v. posticalis (5ae) longiore quam v. transversa posticalis; v. transversâ mediâ in medio inter apices vv. subcostalis et mediastinalis positâ, v. transversâ posticali in ♂ satis, in ♀ paullo ante medium inter venam transversam parvam et cubitum venae discoidalis positâ.

Pedes robusti, sat breves, nigri. Tibiae intermediae extus et intus unisetulosae, setâ externâ validâ et longâ; tibiae posticae normaliter setulosae, in ♂ setâ posticâ longâ. Pulvilli et ungues perparvi.

Longit. corp. 4—5, alarum 3—3,5 mm.

Habitat: Belbek Tauriae, ex puppis *Carpocapsae pomonellae* L., medio Julio.

Черная, брюшко съ блескомъ. Голова въ профилѣ узко-яйцевидная, сверху болѣе широкая; основаніе головы (basis capitis) короткое, округлое; затылокъ (occiput) плоскій; лобъ наклонный, отчасти выпуклый, слегка выдающійся, у ♂ нѣсколько шире, около $\frac{1}{3}$ ширины головы, у ♀ значительно шире; лицо (facies s. epistoma) слегка направлено назадъ, книзу треугольно расширенное, очень слабо вдавленное, пепельно-голубоватое; края глазъ (orbitae) широкіе, голубовато-пепельные; на нихъ сидятъ 2 щетинки (setae orbitales), направленные впередъ и 5 щетинокъ переднекраевыхъ (s. orbito-frontales) у ♂, 6—7 у ♀, достигающія (внизъ) до основанія 2го членика усиковъ; 3 первыя щетинки (setae) этого ряда у ♂ и 2 у ♀ упруги и немного меньше щетинокъ внутреннихъ темянныхъ (setae verticales); эти щетинки направлены кверху; срединная полоса (vitta frontalis v. spatium interoculare) у ♂ черноватая, у ♀ сѣрая съ блескомъ, при извѣстномъ освѣщеніи грязно-бѣлая, спереди довольно глубоко угловато вырѣзанная; узкія щеки (malae) и широкія баки (genae) (= $\frac{1}{2}$ высоты глаза) такого-же цвѣта, какъ и лицо и края лба (orbitae); усики сидятъ высоко на головѣ (т. е. на $\frac{1}{3}$ вышины головы); они отстаютъ отъ лица, длинны и широки и почти достигаютъ рта (os); два основныхъ членика темно-шоколадные, второй членикъ посрединѣ черноватый, третій членикъ черный, въ три раза длиннѣе второго, угловатый, въ срединѣ нѣсколько расширенный; щетинка усиковъ (arista) средней величины, прямая, утолщенная, второй ея членикъ въ три раза длиннѣе перваго, третій членикъ въ 5 разъ длиннѣе второго, при основаніи утолщенный, а въ верхней половинѣ сразу утонченный; ротъ (os) широкій, лицевыя пластинки (carinae faciales) округлыя и снабженные упругими перекрещивающимися лицевыми щетинками (setae mystacinae = Knebelborsten) выше ихъ на нижней половинѣ лицевыхъ пластинокъ (carinae faciales) сидятъ многочисленныя черныя щетинки; баки (genae) довольно густо усажены щетинками; хоботокъ (haustellum = Rüssel) короткій, желтовато-коричневый, щупальца (palpi) также короткія, того-же цвѣта.

Грудь (thorax) черная, съ пепельнымъ налетомъ, болѣе замѣтнымъ по бокамъ; на груди сидитъ нѣсколько рядовъ очень мелкихъ,

акростихальныхъ щетинокъ (setae acrostichales, Acrostichalborsten), 2 setae praescutellares internae, 3 setae dorso-centrales ponesuturales externae, короткія и отогнутыя назадъ; крупнѣе ихъ setae intraalares и очень длинныя setae supraalares; на sternopleura сидятъ 3 щетинки, составляющія малый треугольникъ: сверху на одной горизонтальной линіи сидятъ 2 большія щетинки, а внизу посрединѣ сидитъ одна малая щетинка; на hypopleura расположенъ рядъ, состоящій изъ нѣсколькихъ щетинокъ. Щитокъ (scutellum, Schildchen); черный, съ налетомъ пепельнаго цвѣта, subscutellum довольно большой, пепельный. Metanotum черный, блестящій; на щиткѣ у его вершины сидятъ двѣ очень маленькія щетинки (setae apicales); немного дальше сидятъ двѣ большія не перекрещивающіяся setae subapicales; передъ послѣдними и вблизи ихъ на площадкѣ щитка, посрединѣ ея, расположены 2 довольно большія setae discoidales; по сторонамъ, на краяхъ щитка, расположены одна или двѣ setae laterales и очень длинная seta basalis, сидящая у основанія щитка.

Брюшко (abdomen) яйцевидное, у ♀ широко-яйцевидное, слегка сплющенное, черное, съ блескомъ, почти голое; передніе края колець 2^{го}, 3^{го} и 4^{го} окаймлены свѣтло-пепельною полоской, прерванной посрединѣ. Нижняя часть брюшка (venter) и ноги черныя. Щетинки покрывающія брюшко коротки и расположены по краямъ (marginales); на второмъ и третьемъ кольцахъ расположено по одной парѣ щетинокъ, и лишь на четвертомъ кольцѣ, посрединѣ, расположенъ рядъ упругихъ дискоидальныхъ щетинокъ (у ♂ 13—14, у ♀ 9—10 щетинокъ); кромѣ того четвертый сегментъ у ♂ густо покрытъ короткими щетинками. *Гипопигій* (hypopygium) средней величины, подогнутый подъ животъ, усаженный рѣдкими, но довольно длинными волосками.

Крылья очень широкія, но довольно короткія, у вершины закругленные, прозрачныя, слегка сѣрыя; всѣ жилки слегка желтоваты у основанія крыльевъ, кромѣ внутренней половины субкостальной (vena subcostalis s. 1^a longit. Meig. et Schin.), которая довольно толста и черна; костальная жилка (vena costalis) толста вплоть до впаденія въ нее верхней вѣтви первой продольной жилки (vena mediastinalis), лишь у основанія покрыта щетинками, въ остальной же части голая; vena mediastinalis идетъ параллельно къ костальной (costa), но къ концу внезапно загибается подъ острымъ угломъ къ костальной жилкѣ, съ которой соединяется на $\frac{1}{3}$ внутренней части передняго края крыла, заканчиваясь здѣсь малымъ шипикомъ; подплечевая жилка (v. subcostalis s. v. long. 1^a) толще другихъ, черная, сливается съ костальною на половинѣ края передняго крыла, *жилка эта вооружена 4 или 5 короткими щетинками на пространствѣ отъ угла (cubitus) venae mediastinalis до края крыла*; у основанія локтевой жилки (v. cubitalis s. v. long. 3^a) у ♂ помѣщаются двѣ другія щетинки, изъ которыхъ *вторая очень длинная, у самки же болѣею частью одна очень длинная щетинка*; локтевая жилка оканчивается на самой верхушкѣ крыла; дискоидальная

alae cum v. cubitali nec intime conjunctâ; hinc cellulâ posteore primâ apice nonnihil apertâ; segmento ultimo v. posticalis (5a longiore quam v. transversa posticalis; v. transversâ mediâ in medionter apices vv. subcostalis et mediastinalis positâ, v. transversâ posticali in ♂ satis, in ♀ paullo ante medium inter venam transversam arvam et cubitum venae discoidalis positâ.

Pedes robusti, sat breves, nigri. Tibiae intermediae ctus et intus unisetulosae, setâ externâ validâ et longâ; tibiae postica normaliter setulosae, in ♂ setâ posticâ longâ. Pulvilli et ungues parvi.

Longit. corp. 4—5, alarum 3—3,5 mm.

Habitat: Belbek Tauriae, ex puppis *Carpocapsae pomonae* L., medio Julio.

Черная, брюшко съ блескомъ. Голова въ профиль зко-яйцевидная, сверху болѣе широкая; основаніе головы (basis critis) короткое, округлое; затылокъ (occiput) плоскій; лобъ наклонный, отчасти выпуклый, слегка выдающійся, у ♂ нѣсколько шире, около $\frac{1}{3}$ ширины головы, у ♀ значительно шире; лицо (facies s. pistoma) слегка направлено назадъ, книзу треугольно расширение, очень слабо вдавленное, пепельно-голубоватое; края глазъ (orbites) широкіе, голубовато-пепельные; на нихъ сидятъ 2 щетинки (setae orbitales), направленные впередъ и 5 щетинокъ переднекраевыхъ (s. orbito-frontales) у ♂, 6—7 у ♀, достигающія (внизъ) до основанія 2го членика усиковъ; 3 первыя щетинки (setae) этого ряда у ♂ и 2 у ♀ упруги и немного меньше щетинокъ внутреннихъ темяныхъ (setae verticales); эти щетинки направлены кверху; срединная носца (vitta frontalis v. spatium interoculare) у ♂ черноватая, у ♀ съ блескомъ, при извѣстномъ освѣщеніи грязно-бѣлая, спереди довольно глубоко угловато вырѣзанная; узкія щеки (malae) и широкія бакки (genae) (= $\frac{1}{2}$ высоты глаза) такого-же цвѣта, какъ и лобъ и края лба (orbites); усики сидятъ высоко на головѣ (т. е. на $\frac{1}{2}$ вышины головы); они отстаютъ отъ лица, длинны и широки и почти достигаютъ рта (os); два основныхъ членика темно-шоколадны, второй членикъ посрединѣ черноватый, третій членикъ черный, въ три раза длиннѣе второго, угловатый, въ срединѣ нѣсколько расширенный; щетинка усиковъ (arista) средней величины, прямая, утолщенная, второй ея членикъ въ три раза длиннѣе перваго, третій членикъ въ 5 разъ длиннѣе второго, при основаніи утолщенный, а в верхней половинѣ сразу утонченный; ротъ (os) широкій, лицевыя пластинки (carinae faciales) округлыя и снабженныя упругими пере ещивающимися лицевыми щетинками (setae mystacinac = Kne lborsten) выше ихъ на нижней половинѣ лицевыхъ пластинокъ (carinae faciales) сидятъ многочисленныя черныя щетинки; бакки (genae) довольно густо усажены щетинками; хоботокъ (haustellum = Rüssel) короткий, желтовато-коричневый, щупальца (palpi) также короткія, того же цвѣта.

Грудь (thorax) черная, съ пепельнымъ налетомъ, болѣе замѣтнымъ по бокамъ; на груди сидитъ нѣсколько рядовъ очень мелкихъ,