

акроستيальных щетинокъ (setae acrostichales, Acrostichalborsten), 2 setae raescutellares internae, 3 setae dorso-centrales ponesuturales externa короткія и отогнутыя назадъ; крупнѣе ихъ setae intraalares и очень длинныя setae supraalares; на sternopleura сидятъ 3 щетинки, оставляющія малый треугольникъ: сверху на одной горизонтальной линіи сидятъ 2 большія щетинки, а внизу посрединѣ сидитъ одна малая щетинка; на hyropleurа расположенъ рядъ, состоящій изъ нѣсколькихъ щетинокъ. Щитокъ (scutellum, Schildchen); черный съ налетомъ пепельнаго цвѣта, subscutellum довольно большой, пепельный. Metanotum черный, блестящій; на щиткѣ у его вершины сидятъ двѣ очень маленькія щетинки (setae apicales); немного дальше сидятъ двѣ большія не перекрещивающіяся setae subapicales: передъ послѣдними и вблизи ихъ на площадкѣ щитка, посрединѣ е, расположены 2 довольно большія setae discoidales; по сторонамъ на краяхъ щитка, расположены одна или двѣ setae laterales и очень длинная seta basalis, сидящая у основанія щитка.

Брюшко (abdomen) яйцевидное, у ♀ широко-яйцевидное, слегка сплюснутое, черное, съ блескомъ, почти голое; передніе края колецъ 2^{го} и 4^{го} окаймлены свѣтло-пепельною полоской, прерванной посрединѣ. Нижняя часть брюшка (venter) и ноги черныя. Щетинки покрывающія брюшко коротки и расположены по краямъ (marginales) на второмъ и третьемъ кольцахъ расположено по одной парѣ щетинокъ, и лишь на четвертомъ кольцѣ, посрединѣ, расположенъ рядъ углубленныхъ дискоидальныхъ щетинокъ (у ♂ 13—14, у ♀ 9—10 щетинокъ кромѣ того четвертый сегментъ у ♂ густо покрытъ короткими щетинками. Гипопигій (hypopygium) средней величины, подогнутыѣ подъ животъ, усаженный рѣдкими, но довольно длинными волосками.

Лылья очень широкія, но довольно короткія, у вершины закругленныя, прозрачныя, слегка сѣрыя; всѣ жилки слегка желтоваты у основанія крыльевъ, кромѣ внутренней половины субкостальной (v. subcostalis s. 1^a longit. Meig. et Schin.), которая довольно голста и черна; костальная жилка (vena costalis) толста вплоть до впаденія въ нее верхней вѣтви первой продольной жилки (vena radiastinalis), лишь у основанія покрыта щетинками, въ остальной же части голая; vena mediastinalis идетъ параллельно къ костальной (costa), но къ концу внезапно загибается подъ острымъ угломъ къ костальной жилкѣ, съ которой соединяется на $\frac{1}{3}$ внутренней части передняго края крыла, заканчиваясь здѣсь малымъ шпикомъ; подплечевая жилка (v. subcostalis s. v. long. 1^a) толще другихъ черная, сливается съ костальною на половинѣ края передняго крыла, жилка эта вооружена 4 или 5 короткими щетинками на прострѣствѣ отъ угла (cubitus) v. mediastinalis до края крыла; у основанія локтевой жилки (v. cubitalis s. v. long. 3^a) у ♂ помѣщаются двѣ другія щетинки, изъ которыхъ вторая очень длинная, у самки же большею частью одна очень длинная щетинка; локтевая жилка оканчивается на самой верхушкѣ крыла; дискоидальная

жилка (v. discoidalis s. v. long. 4^a) загибается подъ угломъ передъ концомъ крыла, образуя поперечную жилку (vena transversa apicalis = Spitzenquerader) съ округлымъ угломъ (cubitus), — въ противоположность *Gymnopaeria crassicornis* M g., у которой v. discoidalis загибается кверху *дугообразно*, вовсе не образуя угла; сама vena transversa apicalis посрединѣ замѣтно изогнута и заканчивается у вершины крыла, рядомъ съ локтевою жилкою, однако съ послѣднею не сливается (какъ и у *Gymn. crassicornis* M g.), вслѣдствие чего первая заднекрайняя клѣточка (cellula posterior prima, erste Hinterrandzelle) слегка открыта; задняя жилка (vena posticalis s. v. long. 5^a) длинная, но недоходящая до задняго края крыла; срединная поперечная жилка (v. transversa media s. v. parva = die gewöhnliche oder kleine Querader) помѣщается противъ середины, — между соединеніемъ v. mediastinalis и v. subcostalis; задняя поперечная жилка почти прямая и расположена ближе v. transversa media; конечный сегментъ задней жилки (v. 5^a long.) у ♂ въ два раза длиннѣе задней поперечной жилки (v. transver. posticalis), у ♀ едва короче, нежели у ♂.

Ноги черныя, слегка блестящія, довольно короткія, густо усаженные щетинками; на внутренней сторонѣ переднихъ голеней (tibiae) у ♂ расположено 4—5 короткихъ щетинокъ; на среднихъ голеняхъ расположено по одной внутренней и одной *очень длинной напужной щетинкѣ*; на заднихъ голеняхъ расположенъ рядъ короткихъ щетинокъ; у ♂ имѣется одна *очень длинная щетинка*, сидящая сзади, повыше середины голени.

Когти (unguli) и *присоски* (pulvilli) очень малы, какъ и у нѣкоторыхъ другихъ представителей *Thryptocerinae*.

Видъ этотъ полученъ мною изъ куколокъ *Carpocapsa pomonella* L. ¹⁾, въ первой половинѣ іюля. Станція Бельбекъ въ Крыму.

¹⁾ См. С. А. Мокрецькій, Яблочная плодоярка (*Carpocapsa pomonella* L.). Естественная исторія плодоярки, значеніе ея въ плодоводствѣ и мѣры борьбы съ нею. Составлено по М. V. Slingerland'у „The Codling Moths“. Съ дополненіями относительно Россіи. Симферополь, 1902, стр. 50 и 87.