

Analecta coleopterologica.

Auctore

Andrea Semenov, petropolitano.

IV *).

41. *Carabus (Sphodristocarabus) bohemanni* Ménétr. 1832 orientem versus progreditur saltem usque ad montes Budshnurd in prov. Astrabad Persiae (C. Saaro! IV. 1902; vidi 2 specim. ♂♂), ubi varietate minusculâ (long. ♂ 18—20, lat. 7,5—7,75 mm.), pronoto angustiore basi angustato manifesteque ante angulos posticos coarctato repraesentatur (= var. **astrabadensis** n.). — Etiam *Carabus sculpturatus* Ménétr. 1832 occurrit in montibus prov. Astrabadensis (ubi? — C. Saaro! 1899; vidi 1 specimen ♀ in coll. A. Jakovlev).

42. *Elaphrus tschitscherini* Sem. 1898 (Horae Soc. Ent. Ross., XXXI, p. 595) habitat non solum trans Caucasum, sed etiam cis illum: Kabarda sine certiore indicatione loci (C. Rost! — 2 specim.).

43. *Lathridium quadraticollem* Sem. 1898 (Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, p. 282) meram esse **Lathridii jakovlevi** 1898 (l. c., p. 280) aberrationem praesumo. Cf. etiam Bull. Soc. Nat. Mosc. 1899, № 1, p. 117.

44. Constat, *Onthophagum lineatum* Rtttr. 1890¹⁾ (Verh. Naturf. Ver. Brünn, XXVII, p. 102) eandem esse speciem atque **Onthophagus transcaspicus** Koenig 1889²⁾ (Horae Soc. Ent. Ross., XXIII, p. 302). Ergo nomen ab E. Koenig antea impositum praeferendum.

45. *Rhizotrogus semenovi* Brenske [= *Panotrogus myshenkovi* (Ball. 1871)] est nomen museale, ergo non citandum.

46. **Ammogenia** Sem. 1895 (Horae Soc. Ent. Ross., XXIX, p. 341) non omnino cum gen. *Trigonocnemide* Krtz. 1894 (Wien. Ent. Zeitg., p. 171) quadrat atque saltem subgenus peculiare generis **Kraatziani** efficere mihi videtur. **Ammogeniam lanuginosam** Sem. (1895) eandem esse speciem ac *Trigonocnemis hauseri* Krtz. (1894) inconsulte perperamque declaravit Reitter (Bestimm.-Tabell. d. Melolonth. etc., IV. Th.,

*) Cf. Revue Russe d'Entom., 1903, p. 169.

1) Cf. Bertkau, Bericht üb. d. wiss. Leist. im Geb. d. Entom. währ. d. Jahr. 1890, p. 316 (1891).

2) Cf. Bertkau, Id., währ. d. Jahr. 1889, p. 279 (1890).

1903, p. 42): hae duae species ita inter se differunt, ut duo quidem subgenera repraesentare mihi videantur; quod jam e descriptione meâ *Ammogeniae lanuginosae* (l. c., pp. 342—345) satis patet. — Synopsin specierum hujus generis conscribere in animo habeo.

47. *Glaphyrus sogdianus* Sem. 1892 ♀ differt a *Gl. turkestanico* Sem. 1889 ♀ (cujus ♂ nondum mihi innotuit) non solum iis, quae apud Champenois (Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 347; L'Abeille, XXX, 1903, p. 140) et Reitter (Best.-Tabell. d. Melolonth. etc., IV. Th., 1903, p. 136) afferuntur insignibus, sed etiam prothorace paulo angustiore toto dilute fulvo-crinito fulvoque ad angulos anticos breviter hirsuto (quae hirsutia in *Gl. turkestanico* ♀ semper picea est, crines autem pronotum induentes obscuri vix fulvescentes); etiam antennis et ore pallido-pilosis, elytrorum margine suturali rufo-spinuloso. Doleo, me materialia has duas incerti momenti formas illustrantia non satis completa possidere (6 ♀ *Gl. turkestanici*, 12 ♂, 4 ♀ *Gl. sogdiani*; praeter 1 ♀ *Gl. turkestanici* int. Jaban et Husar in valle Zeravshan superioris a me 28. V. 1888 captam, omnia utriusque formae specimina ad fl. Shing in mont. Zeravshanensibus a D. Glasunov a. 1892 lecta).

48. *Anthypna fairmairei* Sem. 1891 [III] (Horae Soc. Ent. Ross., XXV, № 1—2, p. 330) et *Anthypna dubia* Sem. 1891 [III] (l. c.) referenda sunt sine dubio ad genus *Toxocerus* Fairm. 1891 (Ann. Soc. Ent. Belg., XXXV, C.-R., p. VII), quod jam Reitter (Best.-Tabell. d. Melolonth. etc., IV. Th., 1903, p. 153, nota 2) omni jure praesumpsit.

49. Constat, *Sphenariam rubripedem* Rtttr. 1890³⁾ (Verh. Naturf. Ver. Brünn, XXVII, pp. 115, 116) eandem esse speciem ac *Sphenaria tomentosa* Sem. 1889 [VIII] (Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, № 1—2, pp. 215, 217), *Sphenariam vestitam* Rtttr. 1890 (l. c., p. 116) eandem esse ac *Sphenaria vestita* Sem. 1889 [VIII] (l. c., pp. 215, 218) = *Himatismus (Sphenaria) turkestanicus* Sem. 1891, *Sphenariam komarovi* Rtttr. 1890 (l. c., p. 115) eandem esse ac *Asphena komarovi* Sem. 1889 [VIII] (l. c., p. 218). Descriptiones meae antea pervulgatae sunt, ergo nomina a me imposita praeferenda.

50. *Oenas deserti* Sem. 1891 (Horae Soc. Ent. Ross., XXV, p. 377) est species generis *Lytta* (F.), quam serius L. v. Heyden (in Hauser: Deutsche Ent. Zeitschr., 1894, p. 51) et Escherich (Verh. zool.-botan. Ges. Wien, 1894, pp. 286, 295) sub nomine *Lyttae hauseri* descripserunt. Haec species, *Lytta deserti* (Sem. 1891) nominanda, occurrit, praeter partem orientalem deserti transcaspici Kara-kum dicti etiam in deserto transoxiano quod Kizil-kum dicunt: Igam-berdy (D. Glasunov! 1892, specimina numerosa).

3) Cf. supra, p. 306, nota 1.

Замѣтка о видахъ блохъ, близкихъ къ *Pulex pallidus* Tasch. (Aphaniptera).

Проф. Ю. Вагнера (Кіевъ).

Въ своей монографіи „Die Flöhe“ Taschenberg описаль новый видъ блохъ съ *Herpestes ichneumon* изъ Египта, названный имъ, за блѣдную окраску, *Pulex pallidus* и настолько близкій, по его словамъ, къ человѣческой блохѣ (*P. irritans* L.), что Taschenberg „долго не рѣшался признать эту форму за самостоятельный видъ“. Однако, *P. pallidus* Tasch., вмѣстѣ съ близкими къ нему видами, какъ это сейчасъ будетъ видно, въ дѣйствительности безъ труда отличимъ отъ *P. irritans* L.

Кромѣ свѣтлаго цвѣта Taschenberg указаль только одно отличіе, а именно форму хватательнаго полового аппарата самца. Но указаніе Taschenberg'a весьма неточно и примѣнимо не къ одному, а къ цѣлой серіи или группѣ видовъ. Неточность Taschenberg'овскаго описанія была причиною того, что за *P. pallidus* Tasch. принимались различными лицами и смѣшивались между собою разные виды. Прежде всего я, въ своей замѣткѣ о *P. pallidus* Tasch. въ Horae Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894, p. 440, приняль за этотъ видъ два различныхъ вида, оказавшіеся новыми, съ *Gerbillus* sp. и съ одной ближе не опредѣленной совы, затѣмъ Tiraboschi за тотъ-же видъ приняль экземпляры блохъ, пойманныхъ имъ на *Mus rattus* var. *alexandrinus*¹⁾, наконецъ, Rothschild въ The Entom. Monthly Magaz. (2), XIV, 1903, p. 86, описаль подъ названіемъ *P. witherbyi* дѣйствительнаго *P. pallidus* Tasch.

Описаніе Baker'a²⁾ мало пополнило описаніе Taschenberg'a, такъ какъ и имъ приводимые признаки общи для нѣсколькихъ близкихъ видовъ.

Въ настоящее время къ занимающей насъ группѣ видовъ рода *Pulex*, которую можно назвать „группою *Pulex pallidus* Tasch.“, относятся вмѣстѣ съ ниже описанными 9 видовъ: *P. pallidus* Tasch., *P. longispinus* Wagn., *P. aequisetosus* Enderlein, *P. nubicus* Rothschild, *P. cheopis* Rothschild, *P. regis* Rothschild, *P. cleopatrae* Rothschild,

¹⁾ Описаніе Tiraboschi должно появиться въ скоромъ времени въ печати; я его читаль въ корректурѣ. *P. pallidus* Tiraboschi = *P. cheopis* Rothschild.

²⁾ Baker: Canad. Entomolog., XXVII, 1895, p. 65.