

Н. А. Виолович

ОПИСАНИЕ НОВОГО ВИДА РОДА CHRYSOTOXUM MG. (DIPTERA, SYRPHIDAE) ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Chrysotoxum stackelbergi Violovitsh, sp. n.

Очень характерный вид, резко отличающийся от большинства палеарктических видов рода *Chrysotoxum* Mg. развитыми на всем протяжении среднеспинки (от переднего ее края до щитка) широкими продольными полосами серого налета. Близок *Chr. przewalskii* Ports., от которого его отличают незначительной величины гипопигий самца и почти прямые, без резкого излома близ середины, задние голени самки.




Рис. 1. *Chrysotoxum stackelbergi* Violovitsh, sp. n. ♂. Бочки груди.

С а м е ц. Лоб лимонно-желтый, в длинных желтых волосках, к которым у основания усиков примешиваются короткие черные волоски. Линия соприкосновения глаз незначительно короче длины теменного треугольника. Теменной треугольник черный; затылок в желто-сером налете; теменной треугольник и затылок в длинных желтых волос-

ках. Усики черные, лишь наружная сторона 1-го членика коричневая; длина 3-го членика более чем вдвое превышает длину 1-го и 2-го, вместе взятых. Ариста голая, светлокоричневая; ее длина равна длине 2-го и 3-го члеников усиков, вместе взятых. Лицо лимонно-желтое с светлокоричневатой срединной полосой, опушено длинными желтыми волосками; глаза голые. Среднеспинка темно-металлически-зеленая, в густом серо-голубом матовом налете, с тремя узкими темными продольными полосами посредине и более широкими по бокам; желтые боковые полосы среднеспинки довольно широкие, явственно прерванные посредине. Волосной покров среднеспинки густой, желтый с рыжеватым оттенком. Бочки груди черные, с яркими блестящими желтыми пятнами (рис. 1), занимающими целиком про- и метаплевры, большую заднюю часть мезоплевр и верхние половины стерно- и гипоплевр, на всем протяжении в длинных золотисто-желтых волосках, особенно длинных на мезо- и птероплеврах. Щиток желтый с бурым срединным пятном, в явственных черных волосках, которые по краям сменяются желтыми. Крылья слегка затемненные, вершина субкостальной ячейки желтоватая, r_{4+5} слегка дугообразно изогнут, rm соединяется с r_{4+5} почти под прямым углом. Цвет жилы

коричневатый. Закрыловые чешуйки светложелтые или беловатые. Жужжальцы оранжево-желтые с более светлым стебельком. Ноги целиком желтые, передняя пара и голени средней и задней пар ног более светлые. Брюшко широкое, овальное, черное с желтым рисунком, в коротких желтых и черных волосках. 1-й тергит брюшка черный с маленькими желтыми пятнами по бокам, в длинных желтых волосках; 2—5-й тергиты с широкими дугообразными желтыми, прерванными посредине перевязями, расположенными в передней части тергитов и доходящими до боковых их краев; задние края тергитов с очень широкими желтыми полосами, дугообразно вклинивающимися в середину сегментов (рис. 2). Гипопигий маленький, черный. Брюшко снизу: 1-й и 2-й стерниты светложелтые, просвечивающие, с темными продольной полоской и задним краем 2-го стернита; 3-й стернит черный с двумя светложелтыми пятнами у переднего края; последующие стерниты черные.

Самка. Похожа на самца. Лоб у основания усиков равен $\frac{1}{4}$ ширины головы, в густом желтом налете и коротких желтых волосках; посредине с темной продольной полосой, расширяющейся в коричнево-черное блестящее треугольное пятно, расположенное над основанием усиков. Брюшко снизу, за исключением светложелтого 1-го стернита, черное, с четырьмя парами желтых пятен, расположенных у переднего края каждого из стернитов и уменьшающихся по своим размерам, так что на 5-м стерните они едва заметны.

Длина тела 13—14 мм.

Описание составлено по значительной серии экземпляров, собранных 27 мая и 5 июня 1928 г. Л. С. Зиминым в окрестностях Яргака близ Хатырчи в Узбекской ССР.

Вид назван именем А. А. Штакельберга, много сделавшего для изучения фауны *Syrphidae* Средней Азии.

Типы хранятся в коллекциях Зоологического музея Московского ордена Ленина Государственного Университета им. М. В. Ломоносова, нотипы — в Зоологическом институте Академии Наук СССР в Ленинграде.

Сахалинский филиал
Академии Наук СССР,
Южно-Сахалинск




Рис. 2. *Chrysotoxum stackelbergi*
Violovitsh, sp. n. ♂. Брюшко.