

Л. В. Мулярская

НОВЫЙ ВИД БРАКОНИД (HYMENOPTERA, BRACONIDAE), ПАРАЗИТИРУЮЩИЙ НА ДВУКРЫЛЫХ

При изучении фауны членистоногих, обитающих в птичьих гнездах в Таджикистане, были встречены 5 видов *Braconidae*: *Bracon variegator* (Nees), *Habrobracon brevicornis* (Wesm.), *Habrobracon hebetor* (Say), *Habrobracon telengai*, sp. n. и *Hormica tatianae* (Telenga). Встречались они в гнездах испанского, полевого и домового воробьев, а также сизого голубя.

Чрезвычайно интересным и имеющим значение для перспектив биологического метода борьбы является то обстоятельство, что эти перепончатокрылые паразитировали не на обычных, известных для них хозяевах — гусеницах бабочек, а на личинках мух. Являясь сапрофагами, эти личинки питались детритом растительного и животного характера — перетлевающими частями стебельков и листьев, из которых свито гнездо, чешуйками эпидермиса, отпадавшими с птенцов, их экскрементами и т. п.

Наибольший процент пупариев с лётными отверстиями вылетевших паразитов наблюдался у мух *Helomyza serrata* L. (сем. *Helomyzidae*). Кроме этого вида в числе мух с личинками браконид были следующие 4 вида: *Thaumatomyia notata* Mg. (сем. *Chloropidae*), *Meoneura* sp. (сем. *Milichiidae*), *Fannia canicularis* L. и *Anthomyia pluvialis* L. (сем. *Muscidae*).

Определение мух произведено А. А. Штакельбергом. Правильность выделения нового вида *Braconidae* подтверждена Н. А. Теленгой, которому автор с чувством глубокой признательности посвящает новый вид.

Рисунок нового вида выполнен С. М. Штейнбергом.


В Палеарктике известно 18 видов рода *Habrobracon*. В Советском Союзе констатируется 10 видов, из них — 7 отмечено в Средней Азии. Ниже приводим описание нового вида.

Habrobracon telengai Mularskaia, sp. n.

С а м к а. Тело красновато-желтое. Голова желтая; продольная полоса посредине лица и лба, наличник и затылок красноватые. Усики не толстые, нитевидные, равны длине головы и груди, 19-члениковые, жгутики красноватые, на вершине более темные. Первый членик усиков овальный, остальные членики усиков, исключая второй и девятнадцатый, цилиндрические, длина их раза в два больше ширины. Расстояние между глазами и задними глазками в три раза больше диаметра глазка. Грудь красноватая; щитик почти весь желтый; четырехугольное пятно посредине среднеспинки у заднего края, полоса вдоль парапсид, рисунок на боках переднегруди и два пятна на боках среднегруди под крыльями — желтые. Сред-

неспинка и щитик гладкие. Парапсиды незаметные. Ноги красноватые; вершина последних члеников и коготки черные.

Промежуточный сегмент тонко шагреневанный с коричневой полосой вдоль середины. Брюшко овальное, шире груди, такой же длины, как голова и грудь вместе взятые, сильно шагреневанное, матовое, красноватое, лишь боковые края тергитов желтоватые. II тергит брюшка в 1.5 раза длиннее III, задний его край посередине слабо выемчатый. III тергит не разделен поперечной вдавленной линией. Крылья в основании слегка дымчатые; жилки светлорозовые; стигма широкая светлорозовая с большим желтым пятном в основании. Передний край радиальной ячейки почти в два раза больше стигмы; третий отрезок радиуса почти



Habrobracon telengai Mul., sp. n. ♀.

в три с половиной раза длиннее второго; расстояние между основанием возвратной и первой поперечной кубитальной жилки не более $1/4-1/5$ последней. Второй отрезок радиуса равен первому и длиннее второй поперечной кубитальной жилки. Поперечная субмедиальная жилка интестициальная.

По скульптуре брюшка *Habrobracon telengai*, sp. n. сходен с *Habrobracon genalis* (Marsh.), от которого отличается тонко шагреневанным промежуточным сегментом, отсутствием поперечной вдавленной линии на третьем тергите и нормальной по длине второй кубитальной ячейкой. От *H. si-monovi* Kok. он отличается небольшими глазками.

Распространение. Таджикистан: Сталинабад, Даганакиик.

Тип находится в коллекциях Института энтомологии и фитопатологии Академии наук Украинской ССР (Киев).

Институт зоологии и паразитологии
Академии наук Таджикской ССР,
Сталинабад