

М. Е. Тер-Минасян

**НОВЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ ЕЛИ ИЗ ЮЖНОЙ КИРГИЗИИ
(COLEOPTERA, CURCULIONIDAE)**[M. E. TER-MINASSIAN. A NEW PEST OF FIR (PICEA SCHRENKIANA) FROM
SOUTH KIRGHIZIA (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE)]

В сборах И. К. Махновского из южной Киргизии мною обнаружен новый вид долгоносика из рода *Magdalis*, описание которого дается ниже.

Типы находятся в коллекции Зоологического института Академии наук СССР в Ленинграде.

***Magdalis (Magdalinus) aeneus* Ter-Minassian, sp. n.**

Черный с бронзовым блеском, весь равномерно и довольно густо покрыт желтоватыми прилегающими волосками. Головотрубка равна по длине переднеспинке у самца или голове и переднеспинке вместе у самки, изогнутая, у самца явственно толще, чем у самки, гуще точечная, мало блестящая, у самки головотрубка сверху реже точечная, явственно блестящая. Глаза крупные, кругловатые, не выпуклые, не выступают из контуров головы. Усики самца прикреплены близ середины, у самки непосредственно за серединой головотрубки. Стволик их явственно изогнут; 1-й членик жгутика равен по длине 2-му и 3-му, вместе взятым, 2-й слегка длиннее половины 1-го, остальные мало отличаются по длине, поперечные; булава крупная с хорошо отграниченными члениками. Переднеспина по длине почти равна своей ширине у основания, сверху и по бокам довольно сильно выпуклозакругленная, с сильной перетяжкой за передним краем, задние углы ее оттянуты и заострены, вся в очень густой и мелкой гранулировке (зернистости), которая в передней половине по бокам особенно сильно сгущена, при взгляде снизу и сбоку расположена в виде кия вдоль бокового края переднеспинки. Щиток небольшой, полукруглый. Надкрылья не менее чем вдвое длиннее общей ширины плеч, с прямым основанием и закруглением к щитку; за основанием каждое надкрылье вдавлено, в результате чего передний край надкрылий явственно приподнят. Надкрылья от плеч слегка расширены назад, с правильными точечными рядами, образованными небольшими точками. Промежутки между точечными рядами широкие, плоские, покрыты двумя, местами тремя неправильными рядами довольно крупных точек, которые по величине мало отличаются от точек, образующих ряды, отчего вся поверхность надкрылий с первого взгляда кажется покрытой общей спутанной точечностью. Надкрылья оставляют открытым только вершину пигидия. Все бедра с небольшим зубцом; зубец на передних бедрах слегка крупнее. Дл. 5.4 мм.

Аркит, южная Киргизия, под корой ветвей ели Шренка, 20 V 1956, 2 ♀♀ (среди них аллотип), 27 X 1958 2 ♂♂ (включая голотип), Маховский.

Хорошо отличается от всех других видов подрода *Magdalinus* Germ. металлически бронзовой окраской, равномерным, довольно густым покровом из желтых волосков, скульптурой поверхности надкрылий.

Зоологический институт
Академии наук СССР,
Ленинград.